

## UPUTE O KORIŠTENJU FEROMONSKOG MAMCA U KLOPCI BRESKVIN MOLJAC - *Anarsia lineatella*



### Prikladna klopka:

✓ **Delta klopka**



### Opis štetnika:

Odrasli kukci imaju smečkasta uska prednja krila s uzdužnim crnim prugama, raspona 14-16 mm.

Gusjenice 16 mm duge, prljavo su bijele kasnije smeđe boje s bijelim prugama i crnom glavom.

Godišnje ima dvije do tri generacije.

Prvi let I. gen je krajem travnja i u svibnju.

Gusjenice I. generacije oštećuje pupove i izboje, koji pri vrhu venu i odumiru.

II. generacija gusjenica (i III. ako se razvije) oštećuje plodove. Gusjenice najčešće ulaze u plod blizu peteljke te se na tom mjestu oštećenja izlučuje smola.

Prezimljuju kao mala gusjenica na granama ili u lišću.

### Kulture:

U najvećoj mjeri napada breskve, nektarine, marelice i bademe ali štete mogu biti i na šljivama, trešnjama i višnjama.

### Upute za korištenje:

- Izvaditi feromonski mamac iz pakiranja neposredno prije same upotrebe
- Iako se ne radi o stvari koja je štetna za ljude, preporuča se koristiti rukavice prilikom postavljanja te oprati ruke prije i nakon korištenja
- Postaviti feromon na ljepljivi umetak klopke i umetnuti ga u već sastavljenu klopku
- Ne ostavljati mamce na direktnom suncu
- Omot od pakiranja odložiti u odgovarajući spremnik za otpad

### Razdoblje korištenja:

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
			15.4.					15.9.			

**Postavljanje klopke:** Postaviti klopku s mamcem u visini očiju, 1,5-2 metra iznad zemlje te je dobro pričvrstiti za granu stabla. Preporuča se klopku staviti u voćnjak u prvoj polovici travnja, a najkasnije 15. travnja.

**Broj klopki po površini:** U svrhu efikasnog praćenja potrebne su otprilike 2-3 klopke po hektaru.

U većim voćnjacima koji imaju ujednačene uvjete broj feromonskih klopki po površini se može smanjiti u skladu s važećom zakonskom preporukom i brojem ARKOD parcela: do uključivo 2 ha 1 klopka; za 2-5 ha min 2 klopke; 5-10 ha min 3 klopke; 10-50 ha min 4 klopke; 50-100 ha min 10 klopki; >100 ha min 20 feromonskih klopki.

**Zamjena mamaca:** svaka 4 do 6 tjedana ili prema važećim preporukama savjetodavne službe. Može varirati ovisno o vremenskim uvjetima, najviše o temperaturi. Pri višim temperaturama mamce treba zamijeniti ranije.

Ljepljivi umetak treba zamijeniti kada je površina prekrivena kukcima. Novi feromonski mamac postaviti na isto mjesto na kojem je bio prethodni.

**Pakiranje:** Mamci su pakirani u vakuumskoj foliji kako bi bili zaštićeni od vanjskih utjecaja.

**Skladištenje:** Čuvati feromonske mamce dobro zatvorene u originalnom pakiranju na suhom i hladnom mjestu, izvan direktnih sunčevih zraka.

Kako bi se sačuvalo djelovanje na duži rok, preporuča se spremati ih u hladnjak te će u tom slučaju biti efikasni i do 24 mjeseca.