

Prikladna klopka:

- ✓ Lovka za masovni ulov
EC FIELD TRAP



Opis štetnika:

Odrasli kukac je crne boje s vidljivim svijetlim točkicama na pokrillju, veličine 10 mm, obrasao brojnim žućkastim dlačicama. Ličinka je bijele boje, svinuta i živi u tlu.

U većem broju se javljaju od travnja do lipnja kad i pricinjavaju najvažnije štete. Odrasli kukac dobro leti pa se lako može seliti s jedne na drugu biljnu vrstu, ovisno o njoj cvatnji. Nakon oplodnje ženke odlažu jaja u tlo.

Dlakavi ružičar ima jednu generaciju godišnje.

Odrasle jedinice u fazi cvatnje izgrizaju cvjetne pupove, dijelove otvorenih cvjetova, prašnike i tučkove te na taj način sprečavaju formiranje plodova.

Kulture:

Voćne, povrtne korovne vrste, uljana repica, žitarice, cvijeće.

UPUTE O KORIŠTENJU FEROMONSKOG MAMCA U KLOPCI DLAKAVI RUŽIČAR – *Epicometis hirta*



Upute za korištenje:

- Izvaditi feromonski mamac iz pakiranja neposredno prije same upotrebe
- Iako se ne radi o tvari koja je štetna za ljude, preporuča se koristiti rukavice prilikom postavljanja te oprati ruke prije i nakon korištenja
- Pričvrstiti feromon u već sastavljenu lovku
- Ne ostavljati mamce na direktnom suncu
- Omot od pakiranja odložiti u odgovarajući spremnik za otpad

Razdoblje korištenja:

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
			15.4.					15.9.			

Postavljanje klopke: Preporuča se klopku staviti u nasad u prvju polovici travnja, a najkasnije 15. travnja.

Broj klopki po površini: Potrebno je postaviti 25 lovki za masovni ulov po hektaru, udaljene 20 m jedna od druge.

U VOĆNJACIMA - postaviti lovke na tlo, u redove i učvrstiti ih pomoću priloženih dijelova kako bi se izbjeglo prevrtanje tijekom vjetrovita vremena. U POLJU - postaviti je na nosač, iznad cvjetajuće kulture. Kada se lovka napuni kukcima ili kada je potrebno zamijeniti feromon (svakih 8 tjedana), očistiti okvire i nastavke te je ponovno postaviti u nasad s novim feromonskim mamcem.

Zamjena mamaca: Zamijeniti svakih 8 tjedana ili prema važećim preporukama savjetodavne službe. Može varirati ovisno o vremenskim uvjetima, najviše o temperaturi. Pri višim temperaturama mamce treba zamijeniti ranije.

Novi feromonski mamac postaviti na isto mjesto na kojem je bio prethodni.

Pakiranje: Mamci su pakirani u vakuumskoj foliji kako bi bili zaštićeni od vanjskih utjecaja.

Skladištenje: Čuvati feromonske mamce dobro zatvorene u originalnom pakiranju na suhom i hladnom mjestu, izvan direktnih sunčevih zraka.

Kako bi se sačuvalo djelovanje na duži rok, preporuča se spremati ih u hladnjak te će u tom slučaju biti efikasni i do 24 mjeseca.