

## UPUTE O KORIŠTENJU FEROMONSKOG MAMCA U KLOPČI JABUČNI SAVIJAČ - *Cydia pomonella*



### Prikladna klopka:

- ✓ Delta klopka



### Opis štetnika:

Odrasli oblik sive je boje sa smeđim poljima, raspona krila 16 -19 mm.

Krajem travnja započinje izljetanje leptira, u svibnju je mnogo intenzivnije i traje do kraja lipnja. Mužjaci se javljaju prije ženki.

Ima dvije generacije godišnje.

Gusjenica jabučnog savijača bjelkaste je boje sa smeđom glavom, duga 2-3 mm, hrani se mesom ploda što uzrokuje crvljivost.

II. gen. je mnogobrojnija te radi najveću štetu na već razvijenim plodovima tijekom srpnja i kolovoza.

Odrasla gusjenica prezimi u kokonu ispod kore te u raznim pukotinama na deblu i debljim granama.

### Kulture:

Jabučni savijač najvažniji je tehnološki štetnik, osim jabuke napada i kruške, šljive, marelice, dunje, orah, bademe, breskve i nektarine.

### Upute za korištenje:

- Izvaditi feromonski mamac iz pakiranja neposredno prije same upotrebe
- lako se ne radi o tvari koja je štetna za ljude, preporuča se koristiti rukavice prilikom postavljanja te oprati ruke prije i nakon korištenja
- Postaviti feromon na ljepljivi umetak klopke i umetnuti ga u već sastavljenu klopku
- Ne ostavljati mamce na direktnom suncu
- Omot od pakiranja odložiti u odgovarajući spremnik za otpad

### Razdoblje korištenja:

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
			15.4.					15.9.			

**Postavljanje klopke:** Postaviti klopku s mamcem na 1,5-2 metra iznad zemlje te je dobro pričvrstiti za granu stabla.

Preporuča se klopku staviti u voćnjak u prvoj polovici travnja, a najkasnije 15. travnja.

**Broj klopki po površini:** U svrhu praćenja potrebne su 1 do 2 klopke po hektaru, s tim da je preporučljivo imati po 3 klopke u jedinstvenom nasadu/imanju.

U većim voćnjacima koji imaju ujednačene uvjete broj feromonskih klopki po površini se može smanjiti u skladu s važećom zakonskom preporukom i brojem ARKOD parcela: do uključivo 2 ha 1 klopka; za 2-5 ha min 2 klopke; 5-10 ha min 3 klopke; 10-50 ha min 4 klopke; 50-100 ha min 10 klopki; >100 ha min 20 feromonskih klopki.

**Zamjena mamaca:** svaka 4 do 6 tjedana ili prema važećim preporukama savjetodavne službe. Može varirati ovisno o vremenskim uvjetima, najviše o temperaturi. Pri višim temperaturama mamce treba zamijeniti ranije.

Ljepljivi umetak treba zamijeniti kada je površina prekrivena kukcima. Novi feromonski mamac postaviti na isto mjesto na kojem je bio prethodni.

**Pakiranje:** Mamci su pakirani u vakuumskoj foliji kako bi bili zaštićeni od vanjskih utjecaja.

**Skladištenje:** Čuvati feromonske mamce dobro zatvorene u originalnom pakiranju na suhom i hladnom mjestu, izvan direktnih sunčevih zraka.

Kako bi se sačuvalo djelovanje na duži rok, preporuča se spremiti ih u hladnjak te će u tom slučaju biti efikasni i do 24 mjeseca.