

Prikladna klopka:

- ✓ Delta klopka

**Opis štetnika:**

Ženke su veće, svijetlo-smeđe. Mužjaci su nešto sitniji, tamnije smeđe boje s izraženom svijetlom prugom, raspona krila 20 – 25 mm.

Gusjenica je u početku bijelo-roza, a kasnije potamni, glava je jasno izražena tamno smeđa, do 25 mm su duge.

Godišnje imaju po dvije generacije, na jugu i četiri, Maksimalni let leptira je krajem svibnja i u lipnju.

Ženka odlaze i po nekoliko stotina jaja. Gusjenice oštećuju sve nadzemne dijelove biljaka: list, metlicu, stabljiku i klipove.

Štete na jabukama, breskvama i paprici čini II. generacija.

Gusjenica prezimi u stabljikama kukuruznica ostavljenim u polju stoga je potrebno mehanički uništiti stabljike nakon berbe.

Kulture:

Najčešće napada kukuruz, paprike, jabuke, breskve, konoplju i suncokret.

UPUTE O KORIŠTENJU FEROMONSKOG MAMCA U KLOPCI
KUKURUZNI MOLJAC- *Ostrinia nubilalis***Upute za korištenje:**

- Izvaditi feromonski mamac iz pakiranja neposredno prije same upotrebe
- Iako se ne radi o stvari koja je štetna za ljude, preporuča se koristiti rukavice prilikom postavljanja te oprati ruke prije i nakon korištenja
- Postaviti feromon na ljepljivi umetak klopke i umetnuti ga u već sastavljenu klopku
- Ne ostavljati mamce na direktnom suncu
- Omot od pakiranja odložiti u odgovarajući spremnik za otpad

Razdoblje korištenja:

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
			15.4.					15.9.			

Postavljanje klopke: Postaviti klopku s mamcem na 1,5 - 2 metra iznad zemlje te je dobro pričvrstiti.

Preporuča se klopku staviti u nasad u prvoj polovici travnja, a najkasnije 15. travnja.

Broj klopki po površini: U svrhu praćenja potrebna je 1 klopka po hektaru, s tim da je preporučljivo imati po 3 klopke u jedinstvenom nasadu/imanju.

U većim nasadima koji imaju ujednačene uvjete broj feromonskih klopki po površini se može smanjiti u skladu s važećom zakonskom preporukom i brojem ARKOD parcela: do uključivo 2 ha 1 klopka; za 2-5 ha min 2 klopke; 5-10 ha min 3 klopke; 10-50 ha min 4 klopke; 50-100 ha min 10 klopki; >100 ha min 20 feromonskih klopki.

Zamjena mamaca: Zamijeniti svaka 4 do 6 tjedana ili prema važećim preporukama savjetodavne službe. Može varirati ovisno o vremenskim uvjetima, najviše o temperaturi. Pri višim temperaturama mamce treba zamijeniti ranije.

Ljepljivi umetak treba zamijeniti kada je površina prekrivena kukcima. Novi feromonski mamac postaviti na isto mjesto na kojem je bio prethodni.

Pakiranje: Mamci su pakirani u vakuumske folije kako bi bili zaštićeni od vanjskih utjecaja.

Skladištenje: Čuvati feromonske mamce dobro zatvorene u originalnom pakiranju na suhom i hladnom mjestu, izvan direktnih sunčevih zraka.

Kako bi se sačuvalo djelovanje na duži rok, preporuča se spremati ih u hladnjak te će u tom slučaju biti efikasni i do 24 mjeseca.