

Bugarova 16
HR-10250 Zagreb
+385 (0)1 5566 704

info@fito-eko.hr
www.fito-eko.hr

Prikladna klopka:

- ✓ Žuta ploča



- ✓ Delta klopka



Opis štetnika:

Odrasle jedinke su metalno sive boje, raspona krila 11 – 14 mm.

Gusjenica su žuto-zelene ako se hrane listovima i plodovima, a žuto-smeđe ako se hrane cvjetom, do 8 mm duge.

Godišnje imaju tri generacije.

Let počinju krajem travnja i u svibnju.

Gusjenice napadaju različite biljne organe:

I. generacija - cvijet te ih zapredaju pređom

II. generacija - plod gdje izgrizaju meso i sjemenku

III. generacija - list, rade hodnike u listu i hrane se njime, što dovodi do pojave mina na listu.

Moljac prezimljuje kao gusjenica ili kukuljica u krošnji masline.

Kulture:

Masline

UPUTE O KORIŠTENJU FEROMONSKOG MAMCA U KLOPCI

MASLININ MOLJAC - *Prays oleae*



Upute za korištenje:

- Izvaditi feromonski mamac iz pakiranja neposredno prije same upotrebe
- Iako se ne radi o tvari koja je štetna za ljude, preporuča se koristiti rukavice prilikom postavljanja te oprati ruke prije i nakon korištenja
- Postaviti feromon na ljepljivi umetak klopke i umetnuti ga u već sastavljenu klopku ili presavijenu žutu ploču
- Ne ostavljati mamce na direktnom suncu
- Omot od pakiranja odložiti u odgovarajući spremnik za otpad

Razdoblje korištenja:

| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|----|-----|------|-------|----|-----|------|-------|-----|-------|-----|------|
| | | | 15.4. | | | | | | 15.9. | | |

Postavljanje klopke: Postaviti klopku s mamcem na 1,5 - 2 metra iznad zemlje te je dobro pričvrstiti na granu.

Preporuča se klopku staviti u voćnjak u prvoj polovici travnja, a najkasnije 15. travnja.

Broj klopki po površini: U svrhu praćenja potrebna je 2 klopke po hektaru, s tim da je preporučljivo imati po 3 klopke u jedinstvenom nasadu/imanju.

U većim maslinicima koji imaju ujednačene uvjete broj feromonskih klopki po površini se može smanjiti u skladu s važećom zakonskom preporukom i brojem ARKOD parcela: do uključivo 2 ha 1 klopka; za 2-5 ha min 2 klopke; 5-10 ha min 3 klopke; 10-50 ha min 4 klopke; 50-100 ha min 10 klopki; >100 ha min 20 feromonskih klopki.

Zamjena mamaca: Zamijeniti svaka 4 do 6 tjedana ili prema važećim preporukama savjetodavne službe. Može varirati ovisno o vremenskim uvjetima, najviše o temperaturi. Pri višim temperaturama mamce treba zamijeniti ranije.

Ljepljivi umetak treba zamijeniti kada je površina prekrivena kukcima. Novi feromonski mamac postaviti na isto mjesto na kojem je bio prethodni.

Pakiranje: Mamci su pakirani u vakuumskoj foliji kako bi bili zaštićeni od vanjskih utjecaja.

Skladištenje: Čuvati feromonske mamce dobro zatvorene u originalnom pakiranju na suhom i hladnom mjestu, izvan direktnih sunčevih zraka.

Kako bi se sačuvalo djelovanje na duži rok, preporuča se spremiti ih u hladnjak te će u tom slučaju biti efikasni i do 24 mjeseca.