

Bugarova 16
HR-10250 Zagreb
+385 (0)1 5566 704

info@fito-eko.hr
www.fito-eko.hr

Prikladna klopka:

- ✓ Žuta ploča



- ✓ Klopka za voćne mušice



Opis štetnika:

Pripada porodici dvokrilaca. Tijelo je dužine 2-3 mm, žuto smeđe boje, ima crvene oči.

Ličinka je bijele boje, dužine 6 mm.

Aktivnost im kreće kada su temperature $>10^{\circ}\text{C}$, najaktivnija je na $20\text{-}30^{\circ}\text{C}$, o čemu ovisi i broj generacija štetnika. U povoljnim uvjetima može imati 15 generacija godišnje, a jedna ženka može položiti do 300 jaja.

Ličinke uništavaju unutrašnjost plodova koji propadaju i trule napadnuti patogenima.

Prezimljuje kao imago na zaštićenim mjestima, iako u povoljnim uvjetima može biti aktivna cijelu godinu.

Kulture:

Različite voćne vrste, jagodičasto, koštičavo i jezgričavo voće i vinova loza.

UPUTE O KORIŠTENJU FEROMONSKOG MAMCA U KLOPCI OCTENA MUŠICA - *Drosophila suzukii*



Upute za korištenje:

- Izvaditi feromonski mamac iz pakiranja neposredno prije same upotrebe
- Iako se ne radi o tvari koja je štetna za ljude, preporuča se koristiti rukavice prilikom postavljanja te oprati ruke prije i nakon korištenja
- Postaviti feromon na ljepljivu unutrašnjost žute ploče ili unutar klopke za voćne mušice
- Ne ostavljati mamce na direktnom suncu
- Omot od pakiranja odložiti u odgovarajući spremnik za otpad

Razdoblje korištenja:

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
			15.4.					15.9.			

Postavljanje klopke: Postaviti klopku s mamcem na 1,5 - 2 metra iznad zemlje te je dobro pričvrstiti na granu.

Preporuča se klopku staviti u voćnjak u prvoj polovici travnja, a najkasnije 15. travnja.

Broj klopki po površini: U svrhu praćenja potrebno je 2 klopke po hektaru, s tim da je preporučljivo imati po 3 klopke u jedinstvenom nasadu/imaju.

U većim voćnjacima koji imaju ujednačene uvjete broj feromonskih klopki po površini se može smanjiti u skladu s važećom zakonskom preporukom i brojem ARKOD parcela: do uključivo 2 ha 1 klopka; za 2-5 ha min 2 klopke; 5-10 ha min 3 klopke; 10-50 ha min 4 klopke; 50-100 ha min 10 klopki; >100 ha min 20 feromonskih klopki.

Zamjena mamaca: Zamijeniti svaka 8 do 10 tjedana ili prema važećim preporukama savjetodavne službe. Može varirati ovisno o vremenskim uvjetima, najviše o temperaturi. Pri višim temperaturama mamce treba zamijeniti ranije.

Ljepljivi umetak treba zamijeniti kada je površina prekrivena kukcima. Novi feromonski mamac postaviti na isto mjesto na kojem je bio prethodni.

Pakiranje: Mamci su pakirani u vakuumskoj foliji kako bi bili zaštićeni od vanjskih utjecaja.

Skladištenje: Čuvati feromonske mamce dobro zatvorene u originalnom pakiranju na suhom i hladnom mjestu, izvan direktnih sunčevih zraka.

Kako bi se sačuvalo djelovanje na duži rok, preporuča se spremiti ih u hladnjak te će u tom slučaju biti efikasni i do 24 mjeseca.