

UPUTE O KORIŠTENJU FEROMONSKOG MAMCA U KLOPCI
PEPELJASTI GROZDOV MOLJAC - *Lobesia botrana***Prikladna klopka:**

- ✓ **Delta klopka**

**Opis štetnika:**

Odrasli oblik ima smeđa prednja krila nepravilno išarana pepeljasto sivom bojom poput mramora, raspona 11 -15 mm.

Gusjenica je zelenkaste boje s tamno smeđom glavom, duga 10-15 mm, prekrivena s 4 reda dlačica.

Godišnje ima tri generacije. Pojavljuje se prije cvjetanja loze.

Gusjenice I. gen uvlače se u cvijet i izjedaju ga. Obavijaju predom zametnute bobice kojima se hrane. Leptiri ljetne generacije polažu jaja na bobice kojima se gusjenice hrane. III. gen se razvija u rujnu u dozrijevajućim grozdovima ili između njih ako je vlažno. Prezimljuje kao kukuljica u čistoj bijeloj čahurici, ispod kore čokota, ali i u prostorijama gdje se grožđe prerađuje.

Kulture:

Iako je zabilježeno da napada i druge kulture, najvažniji je štetnik na vinovoj lozi.

Upute za korištenje:

- Izvaditi feromonski mamac iz pakiranja neposredno prije same upotrebe
- Iako se ne radi o tvari koja je štetna za ljude, preporuča se koristiti rukavice prilikom postavljanja te oprati ruke prije i nakon korištenja
- Postaviti feromon na ljepljivi umetak klopke i umetnuti ga u već sastavljenu klopku
- Ne ostavljati mamce na direktnom suncu
- Omot od pakiranja odložiti u odgovarajući spremnik za otpad

Razdoblje korištenja:

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
			15.4.					15.9.			

Postavljanje klopke: Postaviti klopku s mamcem na 0,5-1 metra iznad zemlje te je dobro pričvrstiti za granu stabla.

Preporuča se klopku staviti u voćnjak u prvoj polovici travnja, a najkasnije 15. travnja.

Broj klopki po površini: U svrhu praćenja potrebne su 1 do 2 klopke po hektaru, s tim da je preporučljivo imati po 2 klopke u jedinstvenom nasadu/imanju.

U većim vinogradima koji imaju ujednačene uvjete broj feromonskih klopki po površini se može smanjiti u skladu s važećom zakonskom preporukom i brojem ARKOD parcela: do uključivo 2 ha 1 klopka; 2-5 ha min 2 klopke; 5-10 ha min 3 klopke; 10-50 ha min 4 klopke; 50-100 ha min 10 klopki; >100 ha min 20 feromonskih klopki.

Zamjena mamaca: svaka 4 do 6 tjedana ili prema važećim preporukama savjetodavne službe. Može varirati ovisno o vremenskim uvjetima, najviše o temperaturi. Pri višim temperaturama mamce treba zamijeniti ranije.

Ljepljivi umetak treba zamijeniti kada je površina prekrivena kukcima. Novi feromonski mamac postaviti na isto mjesto na kojem je bio prethodni.

Pakiranje: Mamci su pakirani u vakuumske folije kako bi bili zaštićeni od vanjskih utjecaja.

Skladištenje: Čuvati feromonske mamce dobro zatvorene u originalnom pakiranju na suhom i hladnom mjestu, izvan direktnih sunčevih zraka.

Kako bi se sačuvalo djelovanje na duži rok, preporuča se spremati ih u hladnjak te će u tom slučaju biti efikasni i do 24 mjeseca.