

UPUTE O KORIŠTENJU FEROMONSKOG MAMCA U KLOPČI SAVIJAČ POKOŽICE PLODA - *Adoxophyes orana*



Prikladna klopka:

✓ Delta klopka



Opis štetnika:

Odrasle jedinke imaju smeđe-siva krila s mrljama različitih nijansi, raspona 15 – 22 mm. Mužjaci su nešto sitniji sa svjetlijim žuto-smeđim mrljama.

Gusjenice variraju bojom od žućkaste do smeđe s tamno smeđom glavom, 18 – 22 mm duge.

Ima dvije, nekih godina i tri generacije.

Leptiri se pojavljuju u svibnju/lipnju, a II. gen od srpnja do rujna.

Gusjenice su prvo okupljene na jednom mjestu (20-100). I. gen hrani se listovima pri izboju, II. gen površinom ploda na kojima se stvara krasta.

Gusjenica prezimi na savijenom lišću, ljkuskama pupova i pukotinama na kori.

Kulture:

Najčešće napada **kruške** i **jabuke**, ali i ostale voćke kao što su trešnje, šljive, breskve, nektarine, marelice, dunje, orah, badem i kesten.

Upute za korištenje:

- Izvaditi feromonski mamac iz pakiranja neposredno prije same upotrebe
- Lako se ne radi o tvari koja je štetna za ljude, preporuča se koristiti rukavice prilikom postavljanja te oprati ruke prije i nakon korištenja
- Postaviti feromon na ljepljivi umetak klopke i umetnuti ga u već sastavljenu klopku
- Ne ostavljati mamce na direktnom suncu
- Omot od pakiranja odložiti u odgovarajući spremnik za otpad

Razdoblje korištenja:

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
			15.4.						15.9.		

Postavljanje klopke: Postaviti klopku s mamcem na 1,5 - 2 metra iznad zemlje te je dobro pričvrstiti za granu stabla.

Preporuča se klopku staviti u voćnjak u prvoj polovici travnja, a najkasnije 15. travnja.

Broj klopki po površini: U svrhu praćenja potrebna je 1 klopka po hektaru, s tim da je preporučljivo imati po 3 klopke u jedinstvenom nasadu/imanju.

U većim voćnjacima koji imaju ujednačene uvjete broj feromonskih klopki po površini se može smanjiti u skladu s važećom zakonskom preporukom i brojem ARKOD parcela: do uključivo 2 ha 1 klopka; za 2-5 ha min 2 klopke; 5-10 ha min 3 klopke; 10-50 ha min 4 klopke; 50-100 ha min 10 klopki; >100 ha min 20 feromonskih klopki.

Zamjena mamaca: Zamijeniti svaka 4 do 6 tjedana ili prema važećim preporukama savjetodavne službe. Može varirati ovisno o vremenskim uvjetima, najviše o temperaturi. Pri višim temperaturama mamce treba zamijeniti ranije.

Ljepljivi umetak treba zamijeniti kada je površina prekrivena kukcima. Novi feromonski mamac postaviti na isto mjesto na kojem je bio prethodni.

Pakiranje: Mamci su pakirani u vakuumskoj foliji kako bi bili zaštićeni od vanjskih utjecaja.

Skladištenje: Čuvati feromonske mamce dobro zatvorene u originalnom pakiranju na suhom i hladnom mjestu, izvan direktnih sunčevih zraka.

Kako bi se sačuvalo djelovanje na duži rok, preporuča se spremiti ih u hladnjak te će u tom slučaju biti efikasni i do 24 mjeseca.