

UPUTE O KORIŠTENJU FEROMONSKOG MAMCA U KLOPCI ŠLJIVIN SAVIJAČ - *Grapholita funebrana* BRESKVIN SAVIJAČ- *Grapholita molesta*



Prikladna klopka:

- ✓ Delta klopka



Opis štetnika:

Obje vrste izgledom su nalik, imaju tamnosmeđa prednja krila sa sivom točkom pri vrhu, raspona krila 10-15 mm.

Gusjenice su 9-12 mm duge, crvenkaste boje s tamno smeđom glavom.

Godišnje imaju dvije do tri generacije.

Pojavljuju se već u travnju.

Ženke polažu jaja na listiće i izdanke, a gusjenice progrizaju kožicu ploda, ulaze i hraneći se stvaraju hodnike do sjemenki. Oštećenja su vidljiva kao uvenuće izbojaka i oštećenja te opadanje plodova. Na mjestu ubušavanja u plod pojavljuje se smola.

Prezimljuje zapredena u pukotinama kore, rašljama grana i u zemlji te raznim otpacima koje treba na vrijeme raščistiti.

Kulture:

Napadaju koštičavo voće roda *Prunus*: šljive, breskve, marelice, nektarine, trešnje, bademe.

Upute za korištenje:

- Izvaditi feromonski mamac iz pakiranja neposredno prije same upotrebe
- Iako se ne radi o tvari koja je štetna za ljude, preporuča se koristiti rukavice prilikom postavljanja te oprati ruke prije i nakon korištenja
- Postaviti feromon na ljepljivi umetak klopke i umetnuti ga u već sastavljenu klopku
- Ne ostavljati mamce na direktnom suncu
- Omot od pakiranja odložiti u odgovarajući spremnik za otpad

Razdoblje korištenja:

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
			15.4.					15.9.			

Postavljanje klopke: Postaviti klopku s mamcem na 1,5-2 metra iznad zemlje te je dobro pričvrstiti za granu stabla.

Preporuča se klopku staviti u voćnjak u prvoj polovici travnja, a najkasnije 15. travnja.

Broj klopki po površini: U svrhu praćenja potrebna je 1 klopka po hektaru, s tim da je preporučljivo imati po 3 klopke u jedinstvenom nasadu/imanju.

U većim voćnjacima koji imaju ujednačene uvjete broj feromonskih klopki po površini se može smanjiti u skladu s važećom zakonskom preporukom i brojem ARKOD parcela: do uključivo 2 ha 1 klopka; za 2-5 ha min 2 klopke; 5-10 ha min 3 klopke; 10-50 ha min 4 klopke; 50-100 ha min 10 klopki; >100 ha min 20 feromonskih klopki.

Zamjena mamaca: svaka 4 do 6 tjedana ili prema važećim preporukama savjetodavne službe. Može varirati ovisno o vremenskim uvjetima, najviše o temperaturi. Pri višim temperaturama mamce treba zamijeniti ranije.

Ljepljivi umetak treba zamijeniti kada je površina prekrivena kukcima. Novi feromonski mamac postaviti na isto mjesto na kojem je bio prethodni.

Pakiranje: Mamci su pakirani u vakuumske folije kako bi bili zaštićeni od vanjskih utjecaja.

Skladištenje: Čuvati feromonske mamce dobro zatvorene u originalnom pakiranju na suhom i hladnom mjestu, izvan direktnih sunčevih zraka.

Kako bi se sačuvalo djelovanje na duži rok, preporuča se spremati ih u hladnjak te će u tom slučaju biti efikasni i do 24 mjeseca.