

Bugarova 16
HR-10250 Zagreb
+385 (0)1 5566 704

info@fito-eko.hr
www.fito-eko.hr

Prikladna klopka:

✓ Delta klopka



Opis štetnika:

Odrasli oblik ima prednja krila žuto-smeđe boje s jasno izraženom smeđom poprečnom prugom, raspona 12 -15 mm.

Gusjenica je ružičaste pa i bjelkaste boje s tamno smeđom glavom i nogama, duga 10-12 mm.

Ima dvije generacije.

Pojavljuje se kod temperatura >10°C, obično u svibnju, a u Dalmaciji i polovicom travnja.

Gusjenice I. gen napadaju cvijet i zapredaju ga, dok II. gen. oštećuje zelene plodove tijekom srpnja i kolovoza, a u Dalmaciji već u lipnju.

Prezime u kukuljici na skrovitim mjestima na i oko čokota.

Kulture:

Iako je zabilježeno da napada i druge voćke, najvažniji je štetnik na vinovoj lozi.

UPUTE O KORIŠTENJU FEROMONSKOG MAMCA U KLOPČI ŽUTI GROZDOV MOLJAC - *Eupoecilia ambiguella*



Upute za korištenje:

- Izvaditi feromonski mamac iz pakiranja neposredno prije same upotrebe
- Iako se ne radi o tvari koja je štetna za ljude, preporuča se koristiti rukavice prilikom postavljanja te oprati ruke prije i nakon korištenja
- Postaviti feromon na ljepljivi umetak klopke i umetnuti ga u već sastavljenu klopku
- Ne ostavljati mamce na direktnom suncu
- Omot od pakiranja odložiti u odgovarajući spremnik za otpad

Razdoblje korištenja:

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
			15.4.					15.9.			

Postavljanje klopke: Postaviti klopku s mamcem na 1,5-2 metra iznad zemlje te je dobro pričvrstiti za granu stabla.

Preporuča se klopku staviti u voćnjak u prvoj polovici travnja, a najkasnije 15. travnja.

Broj klopki po površini: U svrhu praćenja potrebne su 1 do 2 klopke po hektaru, s tim da je preporučljivo imati po 3 klopke u jedinstvenom nasadu/imaju.

U većim vinogradima koji imaju ujednačene uvjete broj feromonskih klopki po površini se može smanjiti u skladu s važećom zakonskom preporukom i brojem ARKOD parcela: do uključivo 2 ha 1 klopka; 2-5 ha min 2 klopke; 5-10 ha min 3 klopke; 10-50 ha min 4 klopke; 50-100 ha min 10 klopki; >100 ha min 20 feromonskih klopki.

Zamjena mamaca: Svaka 4 do 6 tjedana ili prema važećim preporukama savjetodavne službe. Može varirati ovisno o vremenskim uvjetima, najviše o temperaturi. Pri višim temperaturama mamce treba zamijeniti ranije.

Ljepljivi umetak treba zamijeniti kada je površina prekrivena kukcima. Novi feromonski mamac postaviti na isto mjesto na kojem je bio prethodni.

Pakiranje: Mamci su pakirani u vakuumskoj foliji kako bi bili zaštićeni od vanjskih utjecaja.

Skladištenje: Čuvati feromonske mamce dobro zatvorene u originalnom pakiranju na suhom i hladnom mjestu, izvan direktnih sunčevih zraka.

Kako bi se sačuvalo djelovanje na duži rok, preporuča se spremiti ih u hladnjak te će u tom slučaju biti efikasni i do 24 mjeseca.