

# Orijentacijski program zaštite i ishrane **BADEMA**

## 1. Zimsko tretiranje (faza mirovanja)

<b>Fertipen Cu</b>	2,0-3,0 l (kovrčavost lista)
--------------------	------------------------------

<b>Laincoil</b>	10,0 l (zimski jaja štetnika)
-----------------	-------------------------------

Ovisno o vremenskim uvjetima, tretiranje ponoviti u razmacima od 7-14 dana.  
Osigurati da se svi mumificirani plodovi od prošle vegetacije uklone sa stabla, jer su oni idealna mjesta za prezimljavanje bolesti i štetnika na bademu.

## 2. Tretiranje u fazi pupanja (ružičasti pup)

<b>Ziram 76 WG</b>	2,0 kg (kovrčavost lista)
--------------------	---------------------------

<b>Litoman ultra</b>	3,0 kg (bajamov cvjetojed, dlakavi ružičar)
----------------------	---

<b>Mastro 50</b>	0,5 % (lisne uši)
------------------	-------------------

## 3. Tretiranje 20% cvatnje

<b>Kastor 50 WP</b>	2,5 kg (šupljikavost lista)
---------------------	-----------------------------

<b>Ekstrasol</b>	3,0 l (palež grančica i cvjetova)
------------------	-----------------------------------

<b>Humibor</b>	1,5-2,0 l (gnojivo na bazi bora za bolju cvatnju i oplodnju)
----------------	--

## 4. Tretiranje 80% cvatnje

<b>FitoMil L-60 eco</b>	2,0 l (kovrčavost lista)
-------------------------	--------------------------

<b>Fungisei</b>	2,0 l (palež grančica i cvjetova)
-----------------	-----------------------------------

<b>Kaishi</b>	2,0 l (biostimulator za bolju oplodnju)
---------------	---

## 5. Tretiranje u fazi intenzivnog rasta (kraj travnja)

<b>Ziram 76 WG</b>	2,5 kg (kovrčavost lista, pjegavost, hrđe)
--------------------	--

<b>Ritmus</b>	0,5 l (lisne uši)
---------------	-------------------

<b>Litoman ultra</b>	4,0 kg (stjenice, lisne uši)
----------------------	------------------------------

<b>Globber</b>	0,4% (biostimulator)
----------------	----------------------

Ukoliko dođe do pojave stresnih situacija (niske temperature, velika količina oborina...) potrebno je tretirati sa aminokiselinama **KAISHI** 2,0 l/ha.

## IZDVOJENI TRETMAN

<b>Grogreen vegetative</b>	3,0 kg (NPK gnojivo s mikroelementima)
----------------------------	--

<b>Fito Film</b>	0,1 % (okvašivač)
------------------	-------------------

## 6. Tretiranje u svibnju

<b>Kastor 50 WP</b>	2,5 kg (šupljikavost)
---------------------	-----------------------

<b>Belthirul</b>	1,0 kg (savijači)
------------------	-------------------

<b>Litoman ultra</b>	4,0 kg (lisne uši, stjenice)
----------------------	------------------------------

<b>FitoBio 20</b>	2,5 l (NPK+aminokiseline)
-------------------	---------------------------

<b>Fito Film</b>	0,1% (okvašivač)
------------------	------------------

### 7. Tretiranje u lipnju

<b>FitoMil L-60 eco</b>	2,5 l (bolesti lista)
<b>Kaolin BPLN</b>	8,0 kg (preventivno za suzbijanje štetnika)
<b>Shigeki</b>	2,5 l (PK gnojivo s aminokiselinama)
<b>Fito Film</b>	0,1% (okvašivač)

Ovisno o vremenskim uvjetima i stanju nasada ponoviti tretiranje. Pratiti štetnike i u slučaju potrebe suzbijati (pauk, lisne uši, stjenice...)

### 8. Tretiranje nakon berbe

<b>FitoMax L-90</b>	2,0 l (bakterioze)
<b>Humibor</b>	2,0 l (gnojivo na bazi bora)
<b>Fito-Kel Zn+Mn</b>	2,5 kg (gnojivo na bazi cinka i mangana)

### 9. Tretiranje prije opadanja lista

<b>Fertipen Cu</b>	2,0 l (kovrčavost)
--------------------	--------------------

### DODATNE NAPOMENE

- Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod **pH minus** u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.

