







Orijentacijski program zaštite i ishrane BRESKVE, NEKTARINE I MARELICE

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
1. Zimsko tretiranje (A) (bubrenje pupa) 	Cupra	2,0 l	Kovrčavost lista	Preporuka je da se zimsko tretiranje, odnosno tretiranje prije kretanja vegetacije, razdvoji na minimalno 3 tretmana zbog boljeg kontroliranja kovrčavosti lista.
	Laincoil	10,0 l	Zimska jaja štetnika	
2. Zimsko tretiranje (A) (pupovi otvoreni 5%) 	Cupra	2,0 l	Kovrčavost lista	FERTIPEN Cu je tekuće gnojivo na bazi bakrenog hidroksida. Bakreni hidroksid ima vrlo fine kristale i tako osigurava vrlo dobru pokrivenost cijele površine biljaka.
	Laincoil	5,0 l	Zimska jaja štetnika	
	ili Fertipen Cu	2,0 l		
3. Zimsko tretiranje (B) 	Ziram 76 WG	2,0 kg	Kovrčavost lista	Za suzbijanje kovrčavosti lista breskve (<i>Taphrina deformans</i>), bitna je učestalost i pravilna aplikacija sredstava za zaštitu.
	Brai	0,5 l	Kalifornijski štitasta uš	
	Litoman ultra	3,0 kg	Štetnici	
	Fito Film	0,1 %	Okvašivač	
4. Tretiranje pred cvatnju (C-D) 	Argo	0,3 l	Kovrčavost lista, palež cvijeta i grančica	MILSAJ-primjenjuje se u količini 0,158-0,2 L/ha i uz utrošak vode od 800-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje kod pojave štetnika, od početka rasta mladica do pune zrelosti plodova (BBCH 31-89). Dodatne informacije: Sredstvo MILSAJ ne smije se primjenjivati tijekom cvatnje (BBCH 60-69) zbog mogućih ostataka u medu.
	Humibor	1,0 l	Gnojivo na bazi bora	
	FitoBio 20	2,0 l	NPK gnojivo s aminokiselinama	
	Milsaj	0,2 l	Kalifornijski trips, breskvini savijač	
	FitoDimel	0,15%	Okvašivač	
5. Tretiranje u punoj cvatnji 	Laitane	2,0 l	Smeđa trulež ploda	KAISHI-biostimulator na bazi hidroliziranih proteina biljnog podrijetla. Kaishi ima veliki udio lizina, aminokiseline koja privlači pčele.
	Ekstrasol	2,5 l	Palež cvijeta i grančica	
	Kaishi	2,0 l	Aminokiseline za bolju oplodnju	

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
6. Tretiranje u fazi opadanja latica 	Scab 480 SC	3,5 l	Šupljikavost lista	QUILATUM-gnojivo sa popratnim djelovanjem protiv biljnih uši (rod Myzus i Aphis) i tripsa. Proizvod na bazi ekstraktata biljaka iz porodice Rutaceae, Lamiaceae, Verbenaceae i Myrtaceae
	Argo	0,25 l	Monilija, pepelnica	
	Quilatium	0,3 %	Trips	
	Litoman ultra	5,0 kg	Trips	
	FitoBio 20	1,5 l	NPK gnojivo s aminokiselinama	
	Wetcit	0,15%	Okvašivač	
7. Tretiranje-formirani plodovi (H) 	Dynamo*	0,5 kg	Šupljikavost lista, krastavost ploda	MIMIC je insekticid za suzbijanje breskvinog savijača (<i>Grapholita molesta</i>) breskvinog moljaca (<i>Anarsia lineatella</i>) u količini od 0,9 L/ha i utrošak vode 1000-1500 L/ha.
	Mimic	0,9 l	Breskvin moljac, breskvin savijač	
	FitoHeliosulfre	3,0 l	Pepelnica	
	FitoAlgen F MnZn	2,0 l	Amikokiseline	
	Wetcit	0,15%	Okvašivač	
8. Tretiranje - formirani plod 	Kastor 50 WP	3,0 kg	Bolesti lista	BELTHIRUL je biološki selektivni insekticid za suzbijanje gusjenica štetnih vrsta leptira.
	Belthirul	1,0 kg	Breskvin savijač	
	Quilatium	0,3%	Zelena breskvina uš	
	Fito Film	0,1%	Okvašivač	
9. Tretiranje - rast plodova (I) 	Kastor 50 WP	3,0 kg	Šupljikavost lista	FITOCAL GOLD je gnojivo koje sadrži kalcij sa sintetiziranim auksinom koji omogućuje da se odvija izmjena tvari kod usvajanja kalcija.
	FitoHeliosulfre	3,0 l	Pepelnica	
	Belthirul	1,0 kg	Breskvin savijač	
	Alvaxor	0,3%	Grinje	
	FitoCal Gold	1,5 l	Gnojivo na bazi kalcija	
10. Tretiranje 20 dana prije berbe 	FitoMil L-60 eco	2,5 l	Bakterijske bolesti	U fazi dozrijevanja plodova, može doći do razvoja gljiva koje uzrokuju trulež plodova. Laitane je pripravak koji sprječava razvoj smeđe truleži ploda.
	Laitane	2,0 l	Smeđa trulež ploda	
	Grogreen fruit	3,0 kg	Gnojivo na bazi kalija	
	Fito Film	0,1%	Okvašivač	
11. Tretiranje - 10 dana prije berbe 	FitoBotryfun	2,5 l	Za bolje čuvanje ploda	Za sprječavanje truleži primijeniti sredstvo FitoBotryfun, koji ima kontaktno preventivno i kurativno djelovanje. Stvara fizičku barijeru i isušuje štetne gljive koje se nalaze na plodu.
	Belthirul	1,0 kg	Savijač pokožice ploda i breskvin moljac	
	Ekstrasol	2,5 l	Sprječavanje truleži	
	Shigeki	3,0 l	PK gnojivo sa aminokiselinama	
	Fito Film	0,15%	Okvašivač	

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
12. Tretiranje nakon berbe	Ziram 76 WG	3,0 kg	Kovrčavost lista	Po potrebi ponoviti.
13. Tretiranje prije opadanja lista	Fito-Kel Zn+Mn	2,5 kg		Gnojiva na bazi cinka, bora i mangana za bolju diferencijaciju pupova i bolju oplodnju naredne sezone.
	Humibor	1,0 l		
	Resil	1,0 l		
14. Tretiranje nakon početka opadanja lišća	FitoFol Cu	0,25 l		FITOFOL Cu-ubrza dozrijevanje mladica.

DODATNE NAPOMENE

- U slučaju kloroza na lista dodati **Grow** u dozi 30-80 g/biljci posipavanjem po tlu oko vočke i inkorporiranjem (unošenjem) u tlo.
- Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod **pH minus** u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida (optimalna pH vrijednost 6.3).
- Sredstva označena u programu sa * nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustava u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.

