

Orijentacijski program zaštite i ishrane JAGODE

1. Tretiranje sadnica prije sadnje

| | |
|-----------|--|
| Ekstrasol | potapanje sadnica u 10% otopini (gljivične bolesti korijena) |
|-----------|--|

2. Tretiranje 3 dana nakon sadnje

| | |
|----------|-------|
| Humitera | 0,5 l |
|----------|-------|

| | |
|-----------|-------------------|
| Lana plus | 0,1 kg (mikoriza) |
|-----------|-------------------|

| | |
|-----------|--|
| MAP 12-61 | 2,5-5 kg/1000 m ² (vodotopivo gnojivo). Primijeniti kroz sustav za navodnjavanje dva puta u razmaku od 14-21 dan. Preporučeni utrošak vode 7500 l/ha. |
|-----------|--|

3. Tretiranje 5-7 dana nakon sadnje

| | |
|--------------|---|
| FitoMax L-90 | 0,2 l (trulež korijena- <i>Phytophthora fragariae</i>) |
|--------------|---|

| | |
|--------------|--|
| NPK 13-40-13 | 2,5-5,0 kg/1000 m ² (vodotopivo gnojivo). Primijeniti kroz sustav za navodnjavanje. |
|--------------|--|

4. Tretiranje u fazi 3-4 lista

| | |
|--------------|---|
| Savial forte | 0,25 l (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>) |
|--------------|---|

| | |
|----------------|--|
| ili Golbex WG* | 0,25 kg (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>) |
|----------------|--|

| | |
|-----------------|---|
| FitoHeliosulfre | 0,3 l (pepelnica). Aplikaciju ponoviti u roku 21 dan. |
|-----------------|---|

| | |
|--------------|--|
| NPK 13-40-13 | 2,5-5,0 kg/1000 m ² (vodotopivo gnojivo). Primijeniti kroz sustav za navodnjavanje. |
|--------------|--|

5. Tretiranje na početku vegetacije (nakon zimskog mirovanja)

| | |
|-------------|---|
| Fertipen Cu | 0,2 l (siva pjegavost lista, bakterijska pjegavost lista) |
|-------------|---|

| | |
|-----------------|-------------------|
| FitoHeliosulfre | 0,3 l (pepelnica) |
|-----------------|-------------------|

| | |
|--------------|--|
| NPK 30-10-10 | 2,5-5,0 kg/1000 m ² (vodotopivo gnojivo). Primijeniti kroz sustav za navodnjavanje. |
|--------------|--|

6. Tretiranje u vegetaciji (intenzivni porast)

| | |
|-----------------|---------------------------|
| FitoHeliosulfre | 0,3 l (pepelnica, grinje) |
|-----------------|---------------------------|

| | |
|--------------|---|
| Savial forte | 0,25 l (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>) |
|--------------|---|

| | |
|---------------|-------------------|
| Litoman ultra | 0,3 kg (štetnici) |
|---------------|-------------------|

| | |
|-----------|--|
| FitoBio20 | 0,3 l (NPK gnojivo s mikroelementima i ekstraktima morskih algi) |
|-----------|--|

| | |
|---------|---|
| Humibor | 0,15 l (gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju) |
|---------|---|

| | |
|--------------|--|
| NPK 20-20-20 | 2,5-5,0 kg/1000 m ² (vodotopivo gnojivo). Primijeniti kroz sustav za navodnjavanje. |
|--------------|--|

7. Tretiranje prije cvatnje

| | |
|--------|-------------------------|
| Signum | 0,15 kg (siva plijesan) |
|--------|-------------------------|

| | |
|--------|--------------------|
| Ritmus | 0,04 l (lisne uši) |
|--------|--------------------|

| | |
|---------|---|
| Humibor | 0,15 l (gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju) |
|---------|---|

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Shigeki | 0,3 l (PK gnojivo sa aminokiselinama) |
|---------|---------------------------------------|

| | |
|--------------|--|
| NPK 30-10-10 | 2,5-5,0 kg/1000 m ² (vodotopivo gnojivo). Primijeniti kroz sustav za navodnjavanje. |
|--------------|--|

8. Tretiranja u fazi formiranja plodova

| | |
|--------------|--|
| Laitane* | 0,2 l (siva plijesan) |
| Zymex | 0,25 l (pepelnica) |
| Ritmus | 0,05 l (lisne uši) |
| Kaishi | 0,25 l (biostimulator na bazi aminokiselina biljnog podrijetla) |
| FitoCal Gold | 0,2 l (gnojivo na bazi kalcija za bolju čvrstoću ploda) |
| FitoFilm | 0,1 % (okvašivač) |
| NPK 20-20-20 | 2,5-5,0 kg/1000 m ² (vodotopivo gnojivo). Primijeniti kroz sustav za navodnjavanje. |

9. Tretiranje prije berbe i u berbi

| | |
|--------------|--|
| Ekstrasol | 0,25 l (siva plijesan, pepelnica) |
| FitoBotryfun | 0,25 l (siva plijesan) |
| ili K-Vitrum | 0,3 l (za bolje čuvanje plodova) |
| Biimore | 0,0125 l (povećanje volumena i boje ploda) |
| NPK 10-8-40 | 2,5-5,0 kg/1000 m ² (vodotopivo gnojivo). Primijeniti kroz sustav za navodnjavanje. |

10. Tretiranje poslije berbe

| | |
|------------------|---|
| Fitomil L-60 eco | 0,25 l (siva pjegavost lista, palež lista) |
| Savial forte | 0,25 l (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>) |

DODATNE NAPOMENE

- Preporuka je bazirana na površini od 1000 m² ili uz utrošak vode od 100 l.
- U slučaju pojave stresnih uvjeta za biljku (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F MnZn** u dozi 0,2 l ili **Kaishi** 0,2 l.
- U slučaju napada puževa, primijeniti sredstvo **Fitolima** u dozi 600 g/1000 m².
- Sredstva označena u programu sa * nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustava u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.

