

# Orijentacijski program zaštite i ishrane LIJESKE

## 1. Tretiranje na početku vegetacije

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Fertipen Cu | 3,0 l (bakterioze) |
|-------------|--------------------|

Bakterijska palež lijeske (*Xanthomonas arboricola* pv. *Corylina*) najefikasnije se suzbija u periodu od kretanja vegetacije pa do početka svibnja. Po potrebi dodati još jedno tretiranje sa gnojivom Fertipen Cu u dozi 1,5 l/ha.

## 2. Tretiranje početkom travnja (rast izdanaka)

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| FitoMil L-60 eco | 2,5 l (pjegavost lista) |
|------------------|-------------------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Fito Film | 1 % (okvašivač) |
|-----------|-----------------|

## 3. Tretiranje krajem travnja

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| FitoMil L60 eco | 2,5 l (bakterioze) |
|-----------------|--------------------|

|            |   |
|------------|---|
| FitoBio 20 | 2,5 l (NPK gnojivo s aminokiselinama-biostimulator) |
|------------|---|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Belthirul | 1,0 kg (gusjenice) |
|-----------|--------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Litoman ultra | 4,0 kg (štetnici) |
|---------------|-------------------|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Mastro 50 | 0,5 % (štetnici) |
|-----------|------------------|

## 4. Tretiranje do sredine svibnja

|               |   |
|---------------|---|
| FitoLabicuper | 2,0 kg (trulež plodova, siva pjegavost lista) |
|---------------|---|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Litoman ultra | 4,0 kg (štetnici) |
|---------------|-------------------|

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| FitoHeliosulfre | 4,0 l (pepelnica, ljeskova grinja) |
|-----------------|------------------------------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Bramisoil | 0,3% (štetnici) |
|-----------|-----------------|

## 5. Tretiranje početkom lipnja

|            |  |
|------------|--|
| FitoBio 20 | 2,0 l (NPK gnojivo s aminokiselinama, biostimulator) |
|------------|--|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Bramisoil | 0,3% (štetnici) |
|-----------|-----------------|

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| FitoHeliosulfre | 3,0 l (pepelnica, ljeskova grinja) |
|-----------------|------------------------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Litoman ultra | 5,0 kg (stjenice) |
|---------------|-------------------|

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Globber | 0,4% (biostimulator) |
|---------|----------------------|

## 6. Tretiranje krajem lipnja

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| FitoLabicuper | 2,5 l (bolesti lista) |
|---------------|-----------------------|

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| FitoHeliosulfre | 2,0 l (pepelnica, ljeskova grinja) |
|-----------------|------------------------------------|

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Globber | 0,4% (lisne uši, biostimulator) |
|---------|---------------------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Litoman ultra | 5,0 kg (stjenice) |
|---------------|-------------------|

U slučaju pojave pauka, tretirati sa proizvodom **Alvaxor** u dozi 1,5-1,8 l/ha uz dodatak okvašivača **FitoDimel** 0,25%.

## 7. Tretiranje nakon berbe

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| FitoMax L-90 | 2,0 l/ha (bakterioze) |
|--------------|-----------------------|

### IZDVOJENI TRETMAN

|            |                     |
|------------|---------------------|
| FitoFol Cu | 0,25 l (bakterioze) |
|------------|---------------------|

## DODATNE NAPOMENE

- U slučaju pojave stresnih uvjeta za biljku (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F MnZn** u dozi 2,0 l/ha ili **Kaishi** u dozi 2,0 l.
- Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod **pH minus** u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.

