









## Orijentacijski program zaštite i ishrane MASLINE

Faza rasta	Mjesec	Proizvod	Doza	Napomena
Kretanje vegetacije (BBCH 00-37) 	Veljača	Cupra	240 ml/100 l	Paunovo oko ( <i>Spilocea oligena</i> ) Rak masline ( <i>Pseudomonas savastanoi</i> )
		ili Codimur 50	300 g/100 l	
		Laincoil	1,5 l/100 l	Prezimljujući štetnici
Kretanje vegetacije (BBCH 00-37)	Ožujak	Fitomil L 60 eco	250-350 ml/100 l	Paunovo oko
		FitoDimel	250-300 ml/100 l	Okvašivač
Prije cvatnje (BBCH 50-59) 	Travanj-svibanj	Sugoby	20 g/100 l	Paunovo oko ( <i>Spilocea oligena</i> )
		Humibor	100-150 ml/100 l	Bolja oplodnja
		Kaishi	150-200 ml/100 l	Aminokiseline
		Belthirul	100 g/100 l	Maslinin moljac
		Fito Film	100 ml/100l	Okvašivač
Cvatnja (BBCH 60-68) 	Svibanj	Humibor	150-200 ml/100 l	Bolja oplodnja
		FitoOlivo Plus	200-250 ml/100 l	Kompletna ishrana masline
		Ekstrasol	250-300 ml/100 l	Bakterioze, rak kore
Zametnuti plodovi/ Završetak cvatnje (BBCH 69-71) 	Lipanj	Fito Algen plus	200 ml/100 l	Aminokiseline
		FitoMil L-60 eco	250-350 ml/100 l	Gljive čađavice
		Ritmus	50 ml/100 l	Maslinin moljac
		Fito Film	100 ml/100 l	Okvašivač
		Globber	400 ml/100 l	Bakterioze, rak kore
Veličina ploda 8-10 mm 	Lipanj	Litoman ultra	300-500 g/100 l	Maslinin svrdlaš
		Mastro 50	500 ml/100 l	Štitaste uši
		Ekstrasol	250 ml/100 l	Rak kore
		+ Globber	400 ml/100 l	
Ljetno tretiranje	Srpanj Kolovoz	Kaolin BPLN	3,0-5,0 kg/100 l	Smanjivanje transpiracije, prevencija maslinove muhe
		Fito Film	100 ml/100 l	

Faza rasta	Mjesec	Proizvod	Doza	Napomena
DELMUR TRAP DACUS Maslinina muha (Bactrocera oleae)	Kolovoz Rujan	Lovke se postavljaju u količini 50 lovki/ha (najviše jedna lovka/stablu), prije početka leta prve generacije štetnika, 30-40 dana prije promjene boje plodova ili 50 dana prije berbe (BBCH >70). Priprema sredstva za primjenu i način primjene: Lovke je potrebno izvaditi iz ambalaže i postaviti na visinu 140-180 cm na krajnje grane stabala maslina. Lovke je potrebno ravnomjerno rasporediti po cijeloj površini maslinika.		
Plod 90% konačne veličine, prije promjene boje (BBCH 75-79) 	Rujan	FitoLabicuper	200-300 ml/100 l	Paunovo oko
		Kaolin BPLN	3,0-5,0 kg/100 l	Maslinina muha
		Ritmus	50 ml/100 l	Maslinina muha
		Fito Film	100 ml/100 l	Okvašivač
Prije berbe (BBCH 80-89) 	Listopad	FitoMil L-60 eco	200-300 ml/100 l	Paunovo oko
Nakon berbe 	Studeni	FitoMax L-90	250-350 ml/100 l	Dezinfekcija rana nakon berbe

#### DODATNE NAPOMENE

- U slučaju pojave stresnih uvjeta (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F MnZn** u dozi 2,0 l ili **Kaishi** 1,5-2,0 l.
- Ukoliko se koristi leđna motorna prskalica, preporučene doze potrebno je povećati dva puta zbog smanjenog utroška škropiva.

