

# Orijentacijski program zaštite i ishrane ORAHA

## 1. Tretiranje na početku vegetacije (faza bubrenja pupova)

Fertipen Cu	2,0 l (bakterioze)
-------------	--------------------

## 2. Tretiranje pred cvatnju

FitoMil L-60 eco	2,0 l (siva pjegavost lista, Xantomonas)
------------------	--

FitoHeliosulfre	2,0-3,0 l (sumpor, prirodni terpeni pinusa)
-----------------	---

Grogreen vegetative	2,0 kg (NPK gnojivo sa mikrohranjivima)
---------------------	---

Litoman ultra	4,0 kg (fizička barijera za štetnike)
---------------	---------------------------------------

U slučaju pojave štetnih gusjenica primijeniti **Belthirul** u dozi 1,0 kg/ha.

Protiv bakterioza primijeniti preventivna sredstva za zaštitu pupova, kao i tijekom razdoblja dugotrajne vlažnosti lista. Po potrebi ponoviti 7-10 dana.

## 3. Cvatnja muških cvjetova, travanj

Litoman ultra	4,0 kg (preventivno suzbijanje štetnika)
---------------	--

Ekstrasol	2,0 l (suzbijanje bakterijskih bolesti)
-----------	---

Kaishi	2,0 l (aminokiseline)
--------	-----------------------

## 4. Tretiranje početkom svibnja

Fertipen Cu	2,0 l (siva pjegavost lista, Xantomonas)
-------------	--

Belthirul	1,0 kg (savijač)
-----------	------------------

Globber	0,4% (biostimulator)
---------	----------------------

Litoman ultra	5,0 kg (preventivno štetnici, sprječavanje polaganja jaja orahove muhe)
---------------	---

## 5. Tretiranje u lipnju

FitoMil L-60 eco	2,5 l (bakterioze)
------------------	--------------------

Kaishi	2,0 l (aminokiseline)
--------	-----------------------

Grogreen vegetative	3,0 kg (gnojivo u gel formulaciji sa visokim sadržajem kalija)
---------------------	--

Kaolin BPLN	10,0 kg (sprječavanje ožegotina i štetnika-orahova muha)
-------------	--

## 6. Tretiranje u srpnju

FitoMil L-60 eco	2,0 l (bakterioze)
------------------	--------------------

FitoAlgen F MnZn	2,0 l (aminokiseline)
------------------	-----------------------

Ekstrasol	2,0 l (siva plijesan)
-----------	-----------------------

Kaolin BPLN	10,0 kg (sprječavanje ožegotina i štetnika-orahova muha)
-------------	--

Pratiti stanje u nasadu i u slučaju stresnih uvjeta ponoviti tretiranje, pratiti i pojavu štetnika (lisne uši, pauka, stjenice...) i po potrebi suzbijati.

## 7. Tretiranje nakon berbe

FitoFol B	2,0 l (gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju naredne sezone)
-----------	---

FitoFol Zn	1,0 l (gnojivo na bazi cinka za bolju diferencijaciju pupova naredne sezone)
------------	--

## IZDVOJENI TRETMAN

FitoFol Cu	0,25 l (bakterioze)
------------	---------------------

## DODATNE NAPOMENE

- U slučaju pojave stresnih uvjeta za biljku (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F MnZn** u dozi 2,0 l/ha ili **Kaishi** u dozi 2,0 l/ha.
- Uz insekticide i akricide obavezno koristiti proizvod **pH minus** u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.

