

Orijentacijski program zaštite i ishrane PAPRIKE

1. Priprema tla prije sadnje

Zeo Min	4,0 kg/100 m ² (anorganski poboljšivač tla s kalcijem, magnezijem i zeolitom)
Ca' Verde Activa	5,0-8,0 kg/100 m ² (peletirano organsko gnojivo)

2. Tretiranje tla prije sadnje

Bio Plug	5,0 l/ha (primijeniti za poboljšanje mikrobiološke aktivnosti i oslobađanje nedostupnih hranjiva iz tla)
Karda	2,0-4,0 l/ha (suzbijanje korova prije sadnje)

3. Tretiranje presadnica prije sadnje

Potapanje presadnica u otopinu preparata **Ekstrasol** u koncentraciji 10% (10 l/100 l vode)-preventivna zaštita protiv gljivičnih i bakterijskih bolesti iz tla (*Phytophthora*, *Fusarium*, *Verticillium* i dr.)

4. Tretiranje kroz sustav za navodnjavanje kapanjem nakon presađivanja

Beltanol *	4,0 l/ha (gljivične i bakterijske bolesti iz tla). Aplikacija nakon presađivanja.
Lana Plus	1,0-3,0 kg/ha (mikorizne gljive potiču bolji razvoj korijena i bolje usvajanje hranjiva, što na kraju utječe na povećanje prinosa).
Grogreen starter	5,0-10,0 kg/ha (NPK gnojivo sa pojačanim fosforom za bolje ukorjenjivanje)
Bioptimus	2,0 l/ha (rizobakterije, povećavanje dostupnosti hranjiva i rasta biljke). Aplikacija 15 dana nakon sadnje, ponoviti nakon 30 dana.

5. Tretiranje u vegetaciji

FitoMax L-90	2,5 l/ha (plamenjača, bakterioze)
Milsaj	0,2 l/ha (kalifornijski trips)
Litoman ultra	3,0 kg/ha (kalifornijski trips)
Fito Film	0,1% (okvašivač)

6. Tretiranje u vegetaciji

FitoMil L-60 eco	2,5 l/ha (plamenjača)
Sivar 250 SC*	0,8 l/ha (pepelnica)
Litoman ultra	3,0 kg/ha (kalifornijski trips)
FitoAlgen F MnZn	1,0 l/ha (aminokiseline)
Fito Film	0,1% (okvašivač)

7. Tretiranje u vegetaciji kod formiranja plodova

Globber	0,4% (lisne uši, mineri, bijela mušica, trips)
FitoCal Gold	2,0 l/ha (gnojivo na bazi kalcija za bolju čvrstoću plodova)
Ekstrasol	2,5 l/ha (pepelnica)
Litoman ultra	5,0 kg/ha (protiv štetnika koji bodu i sišu-stjenice)
Fito Dimel	0,15% (okvašivač)

8. Formirani plodovi

FitoBotryfun	2,5 l/ha (siva plijesan)
Belthirul	0,6 kg/ha (gusjenice)
ili Gussan	0,3% (gusjenice)
Fito Film	0,1 % (okvašivač)

U vegetaciji obaviti tretiranje u razmacima 7-10 dana nakon cvatnje s gnojivom FitoCal Gold u dozi 2,0 l/ha ili FitoFol Ca Solum u dozi 2,0 l/ha. Pratiti pojavu bolesti i štetnika.

DODATNE NAPOMENE

- U slučaju pojave stresnih uvjeta (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F MnZn** u dozi 2,0 l/ha ili **Kaishi** 1,5-2,0 l/ha.
- Sredstva označena u programu sa * nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustava u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.

