

Orijentacijski program zaštite i ishrane PŠENICE

Suzbijanje korova

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Tretiranje površine nakon žetve ili poslije sjetve a prije nicanja	Karda	4,0-6,0 l	Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova	Totalni herbicid
Nakon nicanja (Post Em) - u fazi 3 lista do pojave zastavice BBCH 13-39	Nitide	1,0 l	Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova	Suzbija bročiku, slak, kupinu, kiselicu, dvornik
Nakon nicanja (Post Em)- od pojave prvog koljenca do pojave zastavice BBCH 31-39	Corida	15-20 g	Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova	Suzbija kamilicu, rotkvu, gorušicu, mišjakinju, mak, lobodu
Nakon nicanja (Post Em) u fazi 1. ili 2. koljenca BBCH 31-32	Nitide + Corida	0,5 l 10-20 g	Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova	Kombinacija pokriva sve širokolisne korove

Suzbijanje štetnika

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
U vrijeme pojave štetnika	Labamba	75 ml	Suzbijanje lisnih uši	Kontaktni i želučani insekticid

Suzbijanje bolesti

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Od sredine busanja do kasne mliječne zriobe BBCH 25-77	Tebkin 250 EW	1,0 l	Suzbijanje hrđe, pepelnice, smeđe pjegavosti lista i pljevica, paleži klasa	Sistemični fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja
Od početka vlatanja do kraja cvatnje BBCH 31-69	Sivar	1,0 l	Suzbijanje hrđe, pepelnice, septorie	Lokosistemični fungicid
Neposredno prije početka cvatnje ili u samoj cvatnji	Tebkin 250 EW	1,0 l	Zaštita klasa od paleži (<i>Fusarium spp.</i>)	Ne tretirati ako je temperatura >30°C

Prihrana pšenice

Vrijeme primjene	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Tretiranje biljnih ostataka prethodne kulture odmah poslije žetve	Bio Plug	5,0 l	Aktivacija mikrobiološkog potencijala i razgradnja organske tvari	Može se miješati sa herbicidima
U osnovnoj obradi ili predsjetveno ili pod redove u sjetvi	Nutri Top Special NPK 4-12-24	350 kg	Opskrba N,P,K,S,Ca,Mg, Zn,B,Mn,Fe, huminske i fulvinske kiseline , organski ugljik	Gnojivo ima zaštićen fosfor, sporo otpuštajući dušik 40 dana

Vrijeme primjene	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
U sjetvi	Microstart NP 10-48 + Zn 1%	25,0 kg	Startno mikrogranulirano gnojivo za snažno i brzo, nicanje	Deponirati u kontaktu sa sjemenom
Završetak busanja, početak vlatanja BBCH 25-32	Amosulf NG ili Util San	300,0 kg ili 350,0 kg	Osiguranje ukupnih potreba za dušikom i sumporom jednokratnom primjenom	Gnojiva sa sporo otpuštajućim dušikom 90-110 dana
Od početka intenzivnog porasta BBCH>31	Nitrogenius	1,5 l	Slobodnoživući Azotobacter koji fiksira do 80 kg dušika/ha godišnje	Može se miješati sa herbicidima i fungicidima
Od pojave zastavičara do početka nalijevanja BCH 40-72	Azoman N-S-Mg 16-8-4	25,0-30,0 l	Fino izbalansirano folijarno gnojivo, potpuno iskoristivo, u potpunosti mijenja KAN	Utrošak vode 200 l/ha, razmak između primjena 14 dana
Prije najave kišnog vremena ili u vrijeme visoke relativne vlage kad su optimalni uvjeti za razvoj bolesti	Fito Field Cu 5,5%	1,5 l	Osigurava potrebni bakar, podiže nivo fitoaleksina i aktivira obrambeni mehanizam biljke	Tretirati kasno navečer ili ujutro dok su puči otvorene
Od faze početka klasanja BBCH>50	KingFol S	1,5 l	Pozitivno djeluje na zdravstveno stanje povećava postotak proteina u zrnu	Ne primjenjivati na temperaturama >25°C
U stresnim uvjetima (suša, tuča, niske temperature i sl.)	Amive	1,5 l	Jača staničnu stjenku, aktivira fotosintezu i rad puči	Biostimulator koji sadrži 12% aminokiselina biljnog podrijetla, odmah usvojiv od strane biljke

DODATNE NAPOMENE

- Uz primjenu sredstava za zaštitu bilja preporuka je koristiti pomoćno sredstvo-okvašivač **Fito Film** u dozi 0,2 l/ha, smanjuje površinsku napetost škropiva, pojačava njegovo prianjanje na lisnu masu, sprječava ispiranje i na taj način povećava djelotvornost sredstava za zaštitu bilja.

