

# Orijentacijski program zaštite i ishrane ŠEĆERNE REPE

## Suzbijanje korova

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Prije sjetve	Karda	1,5 l	Suzbijanje ranog porasta svih korova	Primijeniti minimalno 48 sati prije sjetve

## Suzbijanje bolesti

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Od potpunog zatvaranja redova do faze kada je korijen dostigao veličinu za vađenje BBCH 39-49	Argo	0,2-0,3 l	Suzbijanje pjegavosti lista	Primijeniti preventivno i u kombinaciji sa bakrom i okvašivačem Fito Film u dozi 0,3-0,5 l/ha najviše 3 puta u jednoj vegetacijskoj sezoni.
Od potpunog zatvaranja redova do faze kada je korijen dostigao veličinu za vađenje BBCH 39-49	Fertipen Cu	1,8 l	Suzbijanje pjegavosti lista	Tekuće gnojivo, 400 g/l bakrenog hidroksida+derivati prirodnih terpena (Fito Film); primijeniti u kombinaciji sa sistemikom

## Prihrana šećerne repe

Vrijeme primjene	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Tretman žetvenih ostataka predkulture	Bio Plug	5,0 l	Razgradnja organske tvari i ubrzana tvorba humusa	Može se miješati sa herbicidima
U osnovnoj obradi ili predsjetveno ili pod redove u sjetvi	Nutri Top Special NPK 4-12-24 S,Ca,Mg 12-7-1	400,0 kg	Opskrba N,P,K,S,Ca,Mg Zn,B,Mn,Fe, huminske i fulvinske kiseline, organski ugljik	Gnojivo ima zaštićen fosfor, sporo otpuštajući dušik 40 dana
U sjetvi	Microstart (NP 10-40)	25,0 kg	Startno mikrogranulirano gnojivo koje osigurava ujednačeno i brzo nicanje	Deponirati u direktni kontakt sa sjemenom.
Prihrana u fazi 2-6 listova BBCH 12-16	Amosulf NG N-S (33-29)	200,0 kg	Opskrba dušikom i sumporom	Gnojivo sa sporo otpuštajućim dušikom 90-110 dana
Primijeniti neposredno prije stvaranja uvjeta za zarazu	Fito Field Cu 5,5%	1,5 l	Osigurava potrebni bakar, podiže nivo fitoaleksina i aktivira obrambeni mehanizam biljke	Tretirati kasno poslijepodne ili navečer kada su puči otvorene
Od faze 3 lista do zatvaranja redova	Azoman (N-S-Mg) 16-8-4	25,0-30,0 l	Fino izbalansirano folijarno gnojivo, potpuno iskoristivo	Utrošak vode 200 l/ha, razmak između primjena 14 dana
Prije zatvaranja redova može se kombinirati sa Azomanom	Nitrogenius	2,0 l	Slobodno živući Azotobacter koji fiksira do 80 kg dušika po ha godišnje	Može se miješati sa herbicidima

Vrijeme primjene	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Do zatvaranja redova	Bio Eho	2,0 l	Sprječavanje i usporavanje razvoja bolesti	Moguće miješati sa svim pesticidima
Tretiranje u fazi BBCH 32-38	FitoFol B	4,0 l	Pospješuje razvoj rozete i balansira raspodjelu suhe tvari u korijenu	Primijeniti prije zatvaranja redova
U stresnim uvjetima (suša, tuča, niske ili visoke temperature, jak napad bolesti i štetnika i sl.)	Amive	1,5 l	Jača staničnu stjenku, aktivira fotosintezu i rad puči	Biostimulator koji sadrži 12% aminokiselina biljnog podrijetla, odmah usvojiv od strane biljke

#### DODATNE NAPOMENE

- Uz primjenu sredstava za zaštitu bilja preporuka je koristiti pomoćno sredstvo-okvašivač **Fito Film** u dozi 0,2 l/ha jer smanjuje površinsku napetost škropiva, pojačava njegovo prianjanje na lisnu masu, sprječava ispiranje i na taj način povećava djelotvornost sredstava za zaštitu bilja.

