

# Orijentacijski program zaštite i ishrane SOJE

## Suzbijanje korova

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Prije sjetve	Karda	1,5 l	Suzbijanje ranog porasta svih korova	Primijeniti minimalno 48 sati prije sjetve
Nakon sjetve-prije nicanja (Pre Em)	Clown*	2,5 l	Zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova	Kombinirati sa zemljišnim herbicidom za uskolisne korove

## Inokulacija sjemena soje

Vrijeme primjene	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Tretman sjemena i do 90 dana prije sjetve	Biofor Soya liquid	0,5 l/100 kg sjemena	Inficiranje korijena simbiotskim bakterijama roda <i>Bradyrhizobium japonicum</i>	Ne izlagati tretirano sjeme suncu

## Prihrana soje

Vrijeme primjene	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Tretiranje biljnih ostataka prethodne kulture odmah poslije žetve	Bio Plug	5,0 l	Aktivacija mikrobiološkog potencijala i razgradnja organske tvari	Može se miješati sa herbicidima
U proljeće prije osnovne obrade	Biofor Bio P	2,0 l	Oslobađanje kemijski vezanog fosfora iz tla pomoću bakterijskih fosfataza	<i>Bacillus megaterrium</i> , <i>Pseudomonas putida</i>
U osnovnoj obradi ili predsjetveno ili pod redove u sjetvi	Nutri Top Special NPK 4-12-24 S,Ca,Mg 12-7-1	400,0 kg	Opskrba N,P,K,S,Ca,Mg Zn,B,Mn,Fe, huminske i fulvinske kiseline, organski ugljik	Gnojivo ima zaštićen fosfor, sporootpuštajući dušik 40 dana
Primjena gnojiva u sjetvi u direktnom kontaktu sa sjemenom	Microstart NP 10-48 Zn 1%	25,0 kg	Startno mikrogranulirano gnojivo, za snažno i brzo, nicanje	Sijačica sa deponatorima mikrogranula
Od faze prve troliske do zatvaranja redova BBCH 13-16	Azoman N-S-Mg (16-8-4)	25,0-30,0 l	Fino izbalansirano folijarno gnojivo, potpuno iskoristivo	Utrošak vode 200 l/ha, razmak između primjena 14 dana
Tretiranje neposredno prije stvaranja uvjeta za razvoj bolesti	FitoField Cu 5,5%	1,5 l	Osigurava potrebni bakar, podiže nivo fitoaleksina i aktivira obrambeni mehanizam biljke	Tretirati kasno poslijepodne ili ujutro kada su puči otvorene. Jača biljku u borbi protiv plamenjače

Vrijeme primjene	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
U stresnim uvjetima (suša, tuča, niske i visoke temperature, jak napad štetnika (grinja, stjenica) i sl.	Amive	1,5 l	Jača staničnu stjenku, aktivira fotosintezu i rad puči	Biostimulator koji sadrži 12% aminokiselina biljnog podrijetla, odmah usvojiv od strane biljke

#### DODATNE NAPOMENE

- Uz primjenu sredstava za zaštitu bilja preporuka je koristiti pomoćno sredstvo-okvašivač **Fito Film** u dozi 0,2 l/ha, smanjuje površinsku napetost škropiva, pojačava njegovo prijanjanje na lisnu masu, sprječava ispiranje i na taj način povećava djelotvornost sredstava za zaštitu bilja.
- Sredstva označena u programu sa \* nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustava u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.

