











Orijentacijski program zaštite i ishrane

TREŠNJE I VIŠNJE

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
1. Tretiranje u fazi kretanja vegetacije 	Fertipen Cu	2,0 l	Šupljikavost lista, palež cvjetova, bakterioze	Odstraniti sve izboje na kojima ima rak rana iz koje bi na proljeće krenula curiti smola. Primjeniti bakar prije otvaranja pupova s ciljem suzbijanja gljive (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>) koja prezimljuje u tim šupljinama i postaje aktivna već pri temperaturi od 7-10 C°.
2. Tretiranje u fazi otvaranja pupa 	Laincoil	15,0 l	Zimska jaja štetnika	Provesti kontrolu prisustva štetnika u nasadima trešnje i višnje.
	Brai	0,5 l	Kalifornijska štitasta uš	
3. Tretiranje u fazi pojave bijelog pupa 	Quilatam	0,3%	Uši	Pratiti pojavu lisnih uši i ostalih štetnika. Primijeniti Fito Fol Bor u cilju povećanja klijavosti polena.
	Kastor	2,5 kg	Šupljikavost	
	FitoFol Bor	1,0 l	Gnojivo na bazi bora	
	FitoAlgen F MnZn	1,5 l	Aminokiseline	
	Wetcit	0,15%	Okvašivač	
4. Tretiranje u cvatnji 	Signum	0,75 kg	Monilija	Ekstrasol je preparat na bazi bakterije <i>Bacillus subtilis</i> za suzbijanje bakterijskih i gljivičnih bolesti.
	Kaishi	2,0 l	Aminokiseline	
	Ekstrasol	2,5 l	Bakterioze	
5. Tretiranje u fazi opadanja latica 	Dynamo*	0,7 kg	Šupljikavost lista, kozičavost lista	Pratiti pojavu štetnika i po potrebi ponoviti tretiranje.
	Mospilan 20 SG	0,25 kg	Štetnici	
	FitoAlgen F MnZn	1,5 l	Aminokiseline	
	FitoFol Mn	1,0 l	Produženje mitoze	
	FitoDimel	0,15%	Okvašivač	
6. Tretiranje u fazi formiranih plodova 	Syllit 544 SC	1,25 l	Kozičavost lista	BIIMORE je biostimulator koji podiže razinu šećera, kvalitetu ploda i dužinu čuvanja. Za produženje mitoze u plodovima potrebno je osigurati dovoljno mangana u biljkama.
	Ritmus*	0,5 l	Trešnjina muha	
	Grogreen fruit	3,0 kg	Podizanje šećera u plodu	
	Biimore	0,25 l	Biostimulator	
	Fito Film	0,1%	Okvašivač	

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Formirani plodovi 	Delmur trap			DELMUR TRAP je lovka sastavljena od insekticida i hranidbenog atraktanta za suzbijanje mediteranske voćne muhe (<i>Ceratitis capitata</i>). Lovke se postavljaju u količini 50-80 lovki/ha (najviše jedna lovka/stablu), nakon ulova jedne odrasle jedinke dnevno/lovki za praćenje, 30-40 dana prije promjene boje plodova ili 50 dana prije berbe (BBCH > 70). Broj postavljenih lovki ovisi o brojnosti štetnika. Pri nižoj brojnosti štetnika postaviti manji broj lovki. Lovku je potrebno izvaditi iz ambalaže i postaviti na krajnje grane voćaka, na visinu 140-180 cm. Lovke je potrebno ravnomjerno rasporediti po cijeloj površini voćnjaka.
7. Tretiranje 7-10 dana prije berbe 	Litoman ultra	5,0 kg	Trešnjina muha	FITOCAL GOLD je gnojivo na bazi kalcij-oksida + auksina. Auksin omogućava lakše usvajanje kalcija i u kasnijim fazama dozrijevanja.
	K-Vitrum	2,0 l	Trulež plodova	
	Pirecris*	1,0 l	Lisne uši	
	FitoCal Gold	2,0 l	Kvaliteta plodova	
	Fito Film	0,2%	Okvašivač	
	Hortit	4,0 l	Sprječavanje pucanja plodova	Prirodni biostimulator temeljen na specifičnoj kombinaciji osmoregulatora koji štite usjeve od abiotičkog stresa: nagle promjene temperatura, nedostatak ili višak vode, slanost itd.
8. Tretiranje 3 dana prije planirane berbe 	Prev-Gold	0,5 %	Octena mušica ploda (<i>Drosophila suzukii</i>)	PREV-GOLD ima vrlo veliku učinkovitost suzbijanja octene mušice ploda. FitoBotryfun je preparat na prirodnoj bazi za sprječavanje truleži plodova. Nema karencu i ograničenja u primjeni.
	Litoman ultra	5,0 kg		
	FitoBotryfun	2,5 l	Trulež ploda	
9. Tretiranje nakon berbe	Dynamo*	0,75 kg	Kozičavost lista	
	Belthirul	1,0 kg	Gubar, dudovac	
10. Drugo tretiranje nakon berbe	Syllit 544 SC	1,25 l	Kozičavost lista	
11. Tretiranje prije opadanje lista 	FitoFol B	1,0 l	Bolja oplodnja i formiranje pupova	
	FitoFol Zn	1,0 l		
	FitoFol Mn	0,5 l		
	FitoAlgen Plus	1,0 l		
Izdvojeni tretman	Fertipen Cu	1,5 l	Bakterioze	FERTIPEN Cu sadrži bakar i ima utjecaj na suzbijanje bakterioza, a samim time pridonosi boljem općem stanju nasada u narednoj godini.

DODATNE NAPOMENE

- Kod starijih nasada za pročišćavanje provodnih snopova i pomlađivanje rodniha grana tretirati sredstvom **FitoMax L-90** 2 puta u vegetaciji u dozi 2,0 l/ha.
- Sredstva označena sa * nisu registrirana za primjenu u RH u pojedinoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustva u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.

