

Orijentacijski program zaštite i ishrane ULJANE REPICE

Suzbijanje korova

| Faza tretiranja | Proizvod | Doza/ha | Namjena | Napomena |
|-------------------------|----------|-----------|---|---|
| Prije sjetve | Karda | 1,5 l | Suzbijanje ranog porasta svih korova | Primijeniti minimalno 48 sati prije sjetve |
| Nakon nicanja (Post Em) | Trepach | 1,2-3,0 l | Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova i samoniklih žitarica | Suzbijanje ukolishnih korova u fazi do 3 lista 1-1,2 l/ha |

Suzbijanje bolesti

| Faza tretiranja | Proizvod | Doza/ha | Namjena | Napomena |
|---|---------------|---------|---|--|
| Jesenski tretman u fazi 4-6 listova, BBCH 14-16; Proletni tretman od faze pojave cvjetnih pupova do početka razvoja komuški BBCH 50-71 | Tebkin 250 EW | 1,0 l | Suzbijanje suhe truleži, bijele truleži i koncentrične pjegavosti i koncentracija na razvoj korijena prije zime | Maksimalni broj primjena 2 puta (u jesen i u proljeće) |

Suzbijanje štetnika

| Faza tretiranja | Proizvod | Doza/ha | Namjena | Napomena |
|---------------------------|----------|---------|-----------------|---------------------------------|
| U vrijeme pojave štetnika | Labamba | 75 ml | Repičin sjajnik | Kontaktni i želučani insekticid |

Prihrana uljane repice

| Vrijeme primjene | Proizvod | Doza/ha | Namjena | Napomena |
|---|--|-------------|--|--|
| Tretiranje biljnih ostataka prethodne kulture odmah poslije žetve | Bio Plug | 5,0 l | Aktivacija mikrobiološkog potencijala i razgradnja organske tvari | Može se miješati sa herbicidima |
| U osnovnoj obradi ili predsjetveno ili pod redove u sjetvi | Nutri Top Special NPK 4-12-24 S,Ca,Mg 12-7-1 | 400,0 kg | Opskrba N,P,K,S,Ca,Mg Zn,B,Mn,Fe, huminske i fulvinske kiseline, organski ugljik | Gnojivo ima zaštićen fosfor, sporo otpuštajući dušik 40 dana |
| Prihrana neposredno prije proljetnog porasta | Amosulf NG N-S (33-29) | 250,0 kg | Opskrba dušikom i sumporom jednokratnom primjenom | Sporo otpuštajući dušik 90-110 dana |
| Prije početka intenzivnog porasta BBCH >30 | Nitrogenius | 1,5 l | Slobodno živući Azotobacter koji fiksira do 80 kg dušika /ha godišnje | Može se miješati sa herbicidima i fungicidima |
| U vrijeme intenzivnog porasta | Azoman (N-S-Mg) 16-8-4 | 25,0-30,0 l | Fino izbalansirano folijarno gnojivo, potpuno iskoristivo | Utrošak vode 200 l/ha, razmak između primjena 14 dana |

| Vrijeme primjene | Proizvod | Doza/ha | Namjena | Napomena |
|---|-------------|---------|---|--|
| Tretiranje neposredno prije cvatnje | FitoFol Bor | 4,0 l | Pospješuje razvoj rozete i balansira metabolizam kalcija | |
| U stresnim uvjetima (suša, tuča, niske temperature i sl.) | Amive | 1,5 l | Regulira stanični metabolizam, jača staničnu stjenku, aktivira fotosintezu i rad puči | Biostimulator koji sadrži 12% aminokiselina biljnog podrijetla, odmah usvojiv od strane biljke |

DODATNE NAPOMENE

- Uz primjenu sredstava za zaštitu bilja preporuka je koristiti pomoćno sredstvo-okvašivač **Fito Film** u dozi 0,2 l/ha, smanjuje površinsku napetost škropiva, pojačava njegovo prijanjanje na lisnu masu, sprječava ispiranje i na taj način povećava djelotvornost sredstava za zaštitu bilja.

