Orijentacijski program zaštite i ishrane AGRUMA

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
1. Zimsko tretiranje	Cupra	2,0 l	Gumoze, bakterioze	
	Laincoil ili Estiuoil	30,0 l	Zimska jaja štetnika	
	FitoMax L-90	5,0 l	Vlažna trulež korijena i korijenovog vrata	Primjena kroz sustav za navodnjavanje kapanjem
2. Prvo tretiranje u vegetaciji	Armetil 25	0,8 kg	Gumoze	
	Brai	1,0 l	Štitaste uši	
	FitoBio 20	2,5 l	NPK gnojivo sa mikrohranjivima i aminokiselinama	
	Wetcit	0,2%	Okvašivač	
3. Drugo tretiranje (prije cvatnje)	Golbex WG	5,0 kg	Vlažna trulež korijena i korijenovog vrata	
	Shoshi 25 SC	0,15 l	Crveni pauk agruma, koprivina grinja, obični crveni pauk	
	Belthirul	1,0 kg	Gusjenice moljca agruma	
	Microsync B	1,5 l	Gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju	
	Kaishi	2,5 l	Biostimulator za bolju oplodnju	
	FitoDimel	0,15%	Okvašivač	
4. Treće tretiranje u vegetaciji	Savial forte	2,0 l	Gumoze, trulež ploda	
	Afik	0,2-0,3%	Štitaste uši, grinje	
	Biimore	125 ml	Biostimulator za veći volumen i kvalitetu ploda	
	Grogreen fruit	5,0 l	Gnojivo na bazi kalija za nakupljanje šećera u plodu	
5. Četvrto tretiranje u vegetaciji (srpanj)	Golbex WG	5,0 kg	Vlažna trulež korijena i korijenovog vrata	
	Biimore	125 ml	Biostimulator za veći volumen i kvalitetu ploda	
	Mastro 50	7,5 l	Narančin trnoviti štitasti moljac	
	Kaolin BPLN	10,0 kg	Sunčane ožegotine	
	Delmur trap	0,15%	Mediteranska voćna muha *(Ceratitis capitata)*	Lovke

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
6. Peto tretiranje u vegetaciji (14-21 dan prije berbe)	FitoMil L-60	3,5 l	Bolja kvaliteta ploda i tvrdoća kore	
	FitoAlgen plus	3,0 l	Ublažavanje stresnih situacija	
	Litoman ultra	5,0 kg	Mediteranska voćna muha	
	Prev-Gold	400 ml/100 l	Mediteranska voćna muha, narančin trnoviti štitasti moljac	
7. Tretiranje nakon berbe	Golbex WG	5,0 kg	Vlažna trulež korijena i korijenovog vrata	

DODATNE NAPOMENE:

Delmur trap lovke za mediteransku voćnu muhu (*Ceratitis capitata*)

Lovke se postavljaju u količini 50-80 lovki/ha (najviše jedna lovka/stablu), nakon ulova jedne odrasle jedinke dnevno/lovki za praćenje, 30-40 dana prije promjene boje plodova ili 50 dana prije berbe (BBCH > 70). Broj postavljenih lovki ovisi o brojnosti štetnika. Pri nižoj brojnosti štetnika postaviti manji broj lovki. Lovku je potrebno izvaditi iz ambalaže i postaviti na krajnje grane voćaka, na visinu 140-180 cm. Lovke je potrebno ravnomjerno rasporediti po cijeloj površini voćnjaka.

- U slučaju pojave gljiva čađavica potrebno je „pranje“ sredstvom **FitoDimel** u dozi 0,25-0,35 l/100 l.
- Ukoliko je prisutna ferokloroza uslijed blokade željeza, prije kiše aplicirati na tlo proizvod **NUTROBI Fe** u dozi od 30-60 g po biljci.
- U slučaju napada puževa golaća i puževa s kućicom, primijeniti sredstvo **Fitolima** u dozi 700 g/1000 m^2 aplikacijom po tlu, ovisno po potrebi 2-6 puta.
- Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod **pH minus** u dozi 0,75 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.
- Preporuka je bazirana na utrošku vode od 1500 l/ha.

