# *Orijentacijski program zaštite i ishrane BADEMA*

| Faza tretiranja | Proizvod | Doza | Namjena | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| 1. Zimsko tretiranje (faza mirovanja vegetacije) | Fertipen Cu | 2,0-3,0 l | Kovrčavost lista | Ovisno o vremenskim uvjetima tretiranje ponoviti u razmacima 7-14 dana. Osigurati da se svi mumificirani plodovi iz prošle vegetacije uklone sa stabla jer su oni idealna mjesta za prezimljavanje bolesti i štetnika na bademu. |
| | Laincoil* | 15,0 l | Zimska jaja štetnika | |
| 2. Tretiranje u fazi pupanja (ružičasti pup) | Ziram 76 WG | 2,5 kg | Kovrčavost lista, pjegavost lista | |
| | Litoman ultra | 3,0 kg | Bajamov cvjetojed, dlakavi ružičar | |
| | Mastro 50 | 0,5% | Lisne uši | |
| 3. Tretiranje u fazi 20% cvatnje | Kastor | 2,5 kg | Šupljikavost lista | |
| | Ekstrasol | 3,0 l | Palež grančica i cvjetova | |
| | Microsync B | 1,5-2,0 l | Gnojivo na bazi bora za bolju cvatnju i oplodnju | |
| 4. Tretiranje u fazi 80% cvatnje | Fungisei | 2,0 l | Pjegavost lista/ krastavost, narančasta pjegavost | |
| | FitoMil L-60 eco | 2,0 l | Kovrčavost lista | |
| | Kaishi | 2,0 l | Biostimulator za bolju oplodnju | |
| 5. Tretiranje u fazi intenzivnog rasta (kraj travnja) | Fungisei | 2,5 l | Pjegavost lista/ krastavost, narančasta pjegavost | |
| | Ritmus | 0,5 l | Lisne uši | |
| | Litoman ultra | 4,0 kg | Lisne uši, stjenice | |
| | Globber | 0,4% | Biostimulator | |
| Izdvojeni tretman | Kaishi | 2,0 l | Biostimulator | Izdvojeni tretman ukoliko dođe do stresnih situacija (niske temperature, velika količina oborina i sl.) |
| | Grogreen vegetative | 3,0 kg | NPK gnojivo s mikrohranjivima | |
| | Fito Film | 0,2% | Okvašivač | |
| 6. Tretiranje u svibnju | Kastor | 2,5 kg | Šupljikavost lista | |
| | Belthirul | 1,0 kg | Savijači | |
| | Litoman ultra | 4,0 kg | Lisne uši, stjenice | |
| | Shigeki | 2,5 l | PK gnojivo s aminokiselinama | |
| | Fito Film | 0,2% | Okvašivač | |

| Faza tretiranja | Proizvod | Doza | Namjena | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| 7. Tretiranje u lipnju | FitoMil L-60 eco | 2,5 l | Bolesti lista | Tretiranje ponoviti ovisno o vremenskim uvjetima i stanju nasada. Pratiti štetnike i po potrebi ih suzbijati. |
| | Kaolin BPLN | 8,0 kg | Preventivno protiv sunčanih ožegotina | |
| | Hortit | 5,0 l | Biostimulator | |
| | FitoFilm | 0,2% | Okvašivač | |
| 8. Tretiranje nakon berbe | Ziram 76 WG | 2,5 kg | Kovrčavost lista, pjegavost lista | |
| | Microsync B | 1,0 l | Gnojivo na bazi bora za bolju klijavost polena i oplodnju naredne sezone | |
| | Fito-Kel Zn+Mn | 2,5 kg | Gnojivo na bazi cinka i mangana za bolju diferencijaciju pupova i bolju kondiciju naredne sezone | |
| 9. Tretiranje prije opadanja lista | Fertipen Cu | 2,0 l | Gnojivo na bazi bakra za povećanje otpornosti prema bolestima | |

**DODATNE NAPOMENE**

- Uz insekticide i akricide obavezno koristiti proizvod **pH minus** u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.
- Ukoliko je prisutna ferokloroza uslijed blokade željeza, prije kiše aplicirati na tlo proizvod **NUTROBI Fe** u dozi od 30-60 g po biljci.
- Sredstva označena sa * nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustva u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.

