Orijentacijski program zaštite i ishrane BRESKVE, NEKTARINE I MARELICE

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
1. Zimsko tretiranje (A) (bubrenje pupa) 	Cupra	2,0 l	Kovrčavost lista	Preporuka je da se zimsko tretiranje, odnosno tretiranje prije kretanja vegetacije, razdvoji na minimalno 3 tretmana zbog bolje kontrole kovrčavosti lista.
	Laincoil	15,0 l	Zimska jaja štetnika	
2. Zimsko tretiranje (A) (pupovi otvoreni 5%) 	Codimur 50	2,5 kg	Kovrčavost lista	CODIMUR 50 je fungicid na bazi bakra. Bakarni fungicidi vrlo su širokog spektra i djeluju na velik broj fitopatogenih gljiva i bakterija.
3. Zimsko tretiranje (B) 	Ziram 76 WG	2,5 kg	Kovrčavost lista	LITOMAN ULTRA sa visokim udjelom silicija u kemijskoj strukturi, djeluje na odbijanje štetnika, prvenstveno lisnih uši i tripsa te stvaranje nepovoljnog medija za razvoj bolesti.
	Brai	0,4 l	Kalifornijska štitasta uš	
	Litoman ultra	3,0 kg	Štetnici	
	Fito Film	0,2 %	Okvašivač	
4. Tretiranje pred cvatnju (C-D) 	Argo	0,3 l	Kovrčavost lista, palež cvijeta i grančica	MILSAJ je insekticid koji se primjenjuje u količini 0,158-0,2 L/ha i uz utrošak vode 800-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje kod pojave štetnika, od početka rasta mladica do pune zrelosti plodova (BBCH 31-89). MILSAJ se ne smije primjenjivati tijekom cvatnje (BBCH 60-69) zbog mogućih ostataka u medu.
	Microsync B	1,0 l	Gnojivo na bazi bora	
	FitoBio 20	2,0 l	NPK gnojivo s aminokiselinama	
	Milsaj	0,2 l	Tripsi	
	FitoDimel	0,15 %	Okvašivač	
5. Tretiranje u punoj cvatnji 	Laitane	2,0 l	Smeđa trulež ploda	KAISHI je biostimulator na bazi hidroliziranih proteina biljnog podrijekla. Kaishi ima veliki udio lizina, aminokiseline koja privlači pčele.
	Ekstrasol	2,5 l	Palež cvijeta i grančica	
	Kaishi	2,0 l	Aminokiseline za bolju oplodnju	

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
6. Tretiranje u fazi opadanja latica 	Scab 480 SC	3,5 l	Šupljikavost lista	QUILATUM je gnojivo sa dodatnim djelovanjem protiv biljnih uši (rod Myzus i Aphis) i tripsa. Proizvod na bazi ekstrakata biljaka iz porodice Rutaceae, Lamiaceae, Verbenaceae i Myrtaceae
	Argo	0,25 l	Monilija, pepelnica	
	Quilatum	0,3 %	Tripsi	
	Litoman ultra	5,0 kg		
	FitoBio 20	1,5 l	NPK gnojivo s aminokiselinama	
	Wetcit	0,15 %	Okvašivač	
7. Tretiranje-formirani plodovi (H) 	Dynamo*	0,5 kg	Šupljikavost lista, krastavost ploda	MIMIC je insekticid za suzbijanje breskvinog savijača *(Grapholita molesta)* i breskvinog moljaca *(Anarsia lineatella)* u količini od 0,9 L/ha i utrošak vode 1000-1500 L/ha.
	Mimic	0,9 l	Breskvin moljac, breskvin savijač	
	FitoHeliosulfre	3,0 l	Pepelnica	
	FitoAlgen F MnZn	2,0 l	Amikokiseline	
	Wetcit	0,15 %	Okvašivač	
8. Tretiranje u fazi rasta ploda 	Kastor	3,0 kg	Šupljikavost lista	BELTHIRUL je biološki selektivni insekticid za suzbijanje gusjenica štetnih vrsta leptira.
	Belthirul	1,0 kg	Breskvin savijač	
	Quilatum	0,3%	Zelena breskvina uš	
	Fito Film	0,2%	Okvašivač	
9. Tretiranje nakon 15 dana 	Kastor	3,0 kg	Šupljikavost lista	GROGREEN FRUIT je visoko koncentrirano gnojivo bazirano na kaliju, u kombinaciji sa makrohranjivima i mikrohranjivima.
	Belthirul	1,0 kg	Breskvin savijač	
	FitoHeliosulfre	3,0 l	Pepelnica	
	Grogreen fruit	3,0 kg	Gnojivo na bazi kalija	
	Alvaxor	0,3%	Grinje	
10. Tretiranje 20 dana prije berbe 	Laitane	2,0 l	Smeđa trulež ploda	FITOCAL GOLD je gnojivo koje sadrži kalcij sa sintetiziranim auksinom koji omogućuje da se odvija izmjena tvari kod usvajanja kalcija.
	FitoMil L-60 eco	2,5 l	Bakterijske bolesti	
	FitoCal gold	1,5 l	Gnojivo na bazi kalcija	
	FitoFilm	0,2 %	Okvašivač	
11. Tretiranje - 10 dana prije berbe 	Belthirul	1,0 kg	Savijač pokožice ploda i breskvin moljac	Za sprječavanje truleži plodova neposredno prije berbe primijeniti FITOBOTRYFUN, koji ima kontaktno preventivno i kurativno djelovanje. Stvara fizičku barijeru i isušuje štetne gljive koje se nalaze na plodu.
	FitoBotryfun	2,5 l	Za bolje čuvanje ploda	
	Shigeki	2,5 l	PK gnojivo sa ekstraktom algi	
	FitoFilm	0,2%	Okvašivač	

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
12. Tretiranje nakon berbe	Ziram 76 WG	2,5 kg	Kovrčavost lista	Tretiranje po potrebi ponoviti.
13. Tretiranje prije opadanja lista	Fito-Kel Zn+Mn	2,5 kg	Gnojivo na bazi mangana i cinka	Gnojiva na bazi cinka, mangana i bora za bolju diferencijaciju pupova i bolju oplodnju naredne sezone.
	Microsync B	1,0 l	Gnojivo na bazi bora	
	Resil	1,0 l	Biostimulator	
14. Tretiranje nakon početka opadanja lišća	FitoFol Cu	0,5 l	Ubrzanje dozrijevanja mladica	Ranije opadanje lišća rezultira njegovu bržu razgradnju i smanjivanje infekcijskog potencijala u narednoj vegetaciji.

DODATNE NAPOMENE

- Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod **pH minus** u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida (optimalna pH vrijednost 6.3).
- Ukoliko je prisutna ferokloroza uslijed blokade željeza, prije kiše aplicirati na tlo proizvod **NUTROBI Fe** u dozi od 25-50 g po biljci.
- Sredstva označena u programu sa * nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustava u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.

