Orijentacijski program zaštite i ishrane KUPUSNJAČA

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
1. Priprema tla prije sadnje	Zeo Min	400 kg	Anorganski poboljšivač tla sa kalcijem, magnezijem i zeolitom	
	Ca'Verde Activa	500-800 kg	Organsko peletirano gnojivo	
2. Tretiranje tla prije sadnje	Bio Plug	5,0 l	Razgradnja biljnih ostataka prethodne kulture	
	Karda	2,0-4,0 l	Suzbijanje korova prije sadnje	
	Pendus 330 EC	4,0-5,0 l	Suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova	
3. Tretiranje presadnica prije sadnje	Ekstrasol	10% (10 l/100 l vode)	Preventivna zaštita protiv gljivičnih i bakterijskih bolesti iz tla *(Phytophthora, Fusarium, Verticillium i dr.)*	
4. Tretiranje nakon presađivanja	Grogreen starter	5,0-10,0 kg	NPK gnojivo sa većim udjelom fosfora za bolje ukorjenjivanje	Tretirati kroz sustav za navodnjavanje kapanjem 15 dana nakon sadnje te ponoviti nakon 30 dana
	Bioptimus	2,0 l	Rizobakterije-povećanje dostupnosti hranjiva iz tla	
	Cripthum ili	2,0-4,0 l	Huminske i fulvo kiseline niskog pH	
	Hortumus	10,0-12,0 l	Huminske i fulvo kiseline visokog pH	
5. Tretiranje u vegetaciji	Armetil 25	0,8 kg	Plamenjača	
	Labamba	75 ml	Lisne uši	
	FitoBio 20	2,0 l	NPK gnojivo sa mikrohranjivima i aminokiselinama	
	Wetcit	0,15%	Okvašivač	
6. Tretiranje na početku formiranja glavica	Argo	0,5 l	Gljivična oboljenja	
	Afik	0,1-0,15%	Bijela mušica, tripsi, sovice	
	Litoman ultra	3,0 kg	Preventivna zaštita od štetnika	
	FitoBio 20	2,0 l	NPK gnojivo sa mikrohranjivima i aminokiselinama	
	FitoDimel	0,15%	Okvašivač	
7. Tretiranje u slučaju jačeg napada bolesti i štetnika	Ritmus	0,5 l	Kupusna lisna uš, sovice	
	FitoMil L-60	0,35%	Bakterioze	
	Litoman ultra	5,0 kg	Preventivna zaštita od štetnika	
	Shigeki	2,0 l	NPK gnojivo sa mikrohranjivima i aminokiselinama	
	Fito Film	0,2%	Okvašivač	

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
8. Tretiranje 2 tjedna prije berbe	Belthirul	1,0 kg	Štetnici	
	Fungisei	2,5 l	Siva plijesan, bijela trulež	
	FitoCal gold	2,0 l	Gnojivo na bazi kalcija za bolju kvalitetu	
	Fito Film	0,2%	Okvašivač	
9. Tretiranje prije berbe	Gussan	0,3%	Kupusni bijelac	
	FitoBotryfun	2,5 l	Trulež glavica	
	Wetcit	0,4%	Okvašivač-dodatno djelovanje na bijelu mušicu	

DODATNE NAPOMENE

- Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod **pH minus** u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.

