Orijentacijski program zaštite i ishrane LIJESKE

Faza tretiranja	Proizvod	Doza	Namjena	Napomena
1. Tretiranje na početku vegetacije	Fertipen Cu	3,0 l	Bakterioze	Bakterijska palež lijeske *(Xanthomonas arboricola pv. Corylina)* najefikasnije se suzbija u periodu od kretanja vegetacije pa do početka svibnja. Po potrebi dodati još jedno tretiranje sa gnojivom Fertipen Cu u dozi 1,5 l/ha.
2. Tretiranje početkom travnja	FitoMil L-60 eco	2,5 l	Pjegavost lista	
	Microsync B	1,0 l	Gnojivo na bazi bora	
	Fito Film	0,2%	Okvašivač	
3. Tretiranje krajem travnja	FitoMil L-60 eco	2,5 l	Bakterioze	
	FitoBio 20	2,5 l	NPK gnojivo sa mikrohranjivima i aminokiselinama	
	Belthirul	1,0 kg	Gusjenice	
	Litoman ultra	4,0 kg	Preventivna zaštita od štetnika	
	Mastro 50	0,5%	Štetnici	
4. Tretiranje do sredine svibnja	FitoLabicuper	2,0 l	Trulež plodova, siva pjegavost lista	
	Litoman ultra	4,0 kg	Preventivna zaštita od štetnika	
	FitoHeliosulfre	4,0 l	Pepelnica, ljeskova grinja	
	Bramisoil	0,3%	Štetnici	
5. Tretiranje početkom lipnja	FitoBio 20	2,0 l	NPK gnojivo sa mikrohranjivima i aminokiselinama	
	Bramisoil	0,3%	Štetnici	
	FitoHeliosulfre	3,0 l	Pepelnica, ljeskova grinja	
	Litoman ultra	5,0 kg	Stjenice	
6. Tretiranje krajem lipnja	FitoLabicuper	2,5 l	Bolesti lista	U slučaju pojave pauka, tretirati sa proizvodom ALVAXOR u dozi 1,5-1,8 l/ha uz dodatak okvašivača FitoDimel 0,25%
	FitoHeliosulfre	2,0 l	Pepelnica, ljeskova grinja	
	Globber	0,4%	Biostimulator	
	Litoman ultra	5,0 kg	Stjenice	
7. Tretiranje nakon berbe	FitoMax L-90	2,0 l	Bakterioze	
	Microsync B	1,0 l	Gnojivo na bazi bora za bolju klijavost polena i oplodnju naredne sezone	
IZDVOJENI TRETMAN	FitoFol Cu	0,5 l	Bakterioze	

DODATNE NAPOMENE

- U slučaju pojave stresnih uvjeta za biljku (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F MnZn** u dozi 2,0 l/ha ili **Kaishi** u dozi 2,0 l.
- Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod **pH minus** u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.

