Orijentacijski program zaštite i ishrane MASLINE

Faza rasta	Mjesec	Proizvod	Doza/100 l vode	Napomena
Kretanje vegetacije (BBCH 00-37) 	Veljača	Cupra	240 ml	Paunovo oko (*Spilocea oligena*) Rak masline (*Pseudomonas savastanoi*)
		Laincoil ili Estiuoil	1,5 l	Prezimljujući oblici štetnika
Kretanje vegetacije (BBCH 00-37)	Travanj	Savial forte	150-250 ml	Paunovo oko
		FitoDimel	250-300 ml	Okvašivač
Prije cvatnje (BBCH 50-59) 	Travanj-svibanj	Sugoby	20 g	Paunovo oko (*Spilocea oligena*)
		Microsync B	100-150 ml	Gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju
		Kaishi	150-200 ml	Biostimulator
		Belthirul	100 g	Maslinin moljac
		Fito Film	200 ml	Okvašivač
Cvatnja (BBCH 60-68) 	Svibanj	Microsync B	150-200 ml	Gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju
		FitoOlivo Plus	200-250 ml	Kompletna ishrana masline
		Ekstrasol	250-300 ml	Bakterioze, rak kore
Zametnuti plodovi/ Završetak cvatnje (BBCH 69-71) 	Lipanj	Ritmus	50 ml	Maslinin moljac
		FitoAlgen plus	200 ml	Aminokiseline
		FitoMil L-60 eco	250-350 ml	Rak kore, paunovo oko
		Fito Film	200 ml	Okvašivač
Veličina ploda 8-10 mm 	Lipanj	Litoman ultra	300-500 g	Maslinin svrdlaš
		Estiuoil	500 ml	Maslinov medić
		Ekstrasol	250 ml	Rak kore
		+Globber	400 ml	Biostimulator
Ljetno tretiranje	Srpanj Kolovoz	Kaolin BPLN	3,0-5,0 kg	Smanjivanje transpiracije, prevencija maslinove muhe
		Fito Film	200 ml	Okvašivač

Faza rasta	Mjesec	Proizvod	Doza	Napomena
Maslinina muha *(Bactrocera oleae)*	Kolovoz Rujan	DELMUR TRAP DACUS	Lovke se postavljaju u količini 50 lovki/ha (najviše jedna lovka/stablu), prije početka leta prve generacije štetnika, 30-40 dana prije promjene boje plodova ili 50 dana prije berbe (BBCH >70). Priprema sredstva za primjenu i način primjene: Lovke je potrebno izvaditi iz ambalaže i postaviti na visinu 140-180 cm na krajnje grane stabala maslina. Lovke je potrebno ravnomjerno rasporediti po cijeloj površini maslinika.	
Plod 90% konačne veličine, prije promjene boje (BBCH 75-79) 	Rujan	Savial forte	150-250 ml	Paunovo oko
		Kaolin BPLN	3,0-5,0 kg	Maslinina muha
		Ritmus	50 ml	Maslinina muha
		Fito Film	200 ml	Okvašivač
Prije berbe (BBCH 80-89) 	Listopad	FitoMil L-60 eco	200-300 ml	Paunovo oko
Nakon berbe 	Studeni	FitoMax L-90	250-350 ml	Dezinfekcija rana nakon berbe

DODATNE NAPOMENE

- U slučaju pojave stresnih uvjeta (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F MnZn** u dozi 2,0 l ili **Kaishi** 1,5-2,0 l.
- Ukoliko se koristi leđna motorna prskalica, preporučene doze potrebno je povećati dva puta zbog smanjenog utroška škropiva.

