Orijentacijski program zaštite i ishrane ORAHA

Faza tretiranja	Proizvod	Doza	Namjena	Napomena
1. Tretiranje na početku vegetacije (faza bubrenja pupova)	Fertipen Cu	2,0 l	Bakterioze	
2. Tretiranje pred cvatnju	FitoMil L-60 eco	2,0 l	Siva pjegavost lista, bakterijska crna pjegavost *(Xanthomonas arboricola pv. juglandis)*	U slučaju pojave štetnih gusjenica primijeniti Belthirul u dozi 1,0 kg/ha. Protiv bakterioza primijeniti preventivna sredstva za zaštitu pupova, kao i tijekom razdoblja dugotrajne vlažnosti lista. Po potrebi ponoviti 7-10 dana.
	FitoHeliosulfre	2,0-3,0 l	Pepelnica	
	Grogreen vegetative	2,0 kg	NPK gnojivo sa mikrohranjivima	
	Litoman ultra	4,0 kg	Fizička barijera protiv štetnika	
3. Tretiranje u travnju (cvatnja muških cvjetova)	Litoman ultra	4,0 kg	Fizička barijera protiv štetnika	
	Ekstrasol	2,0 l	Bakterijske bolesti	
	Kaishi	2,0 l	Biostimulator	
4. Tretiranje početkom svibnja	FitoMil L-60	2,5 l	Siva pjegavost lista, bakterijska crna pjegavost *(Xanthomonas arboricola pv. juglandis)*	
	Belthirul	1,0 kg	Orahov savijač	
	Globber	0,4%	Biostimulator	
	Litoman ultra	5,0 kg	Fizička barijera-sprječavanje polaganja jaja orahove muhe	
5. Tretiranje u lipnju	FitoMil L-60 eco	2,5 l	Siva pjegavost lista	
	Kaishi	2,0 l	Biostimulator	
	Grogreen fruit	3,0 kg	Gnojivo na bazi kalija	
	Kaolin BPLN	10,0 kg	Sprječavanje sunčanih ožegotina i napada orahove muhe	
6. Tretiranje u srpnju	FitoMil L-60 eco	2,0 l	Siva pjegavost lista	U slučaju stresnih uvjeta ponoviti tretiranje. Pratiti pojavu štetnika i po potrebi suzbijati.
	FitoAlgen F MnZn	2,0 l	Aminokiseline	
	Kaolin BPLN	10,0 kg	Sprječavanje sunčanih ožegotina i napada orahove muhe	
	Fito Film	0,2%	Okvašivač	

Faza tretiranja	Proizvod	Doza	Namjena	Napomena
7. Tretiranje nakon berbe	Microsync B	2,0 l	Gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju naredne sezone	
	FitoFol Zn	1,0 l	Gnojivo na bazi cinka za bolju diferencijaciju pupova naredne sezone	
IZDVOJENI TRETMAN	FitoFol Cu	0,5 l	Bakterioze	

DODATNE NAPOMENE

- U slučaju pojave stresnih uvjeta za biljku (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F MnZn** u dozi 2,0 l/ha ili **Kaishi** u dozi 2,0 l/ha.
- Uz insekticide i akricide obavezno koristiti proizvod **pH minus** u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.

