Orijentacijski program zaštite i ishrane RAJČICE

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena
1. Priprema tla prije sjetve	Zeo Min	400 kg	Anorganski poboljšivač tla sa kalcijem, magnezijem i zeolitom
	Ca'Verde Activa	500-800 kg	Organsko peletirano gnojivo
2. Tretiranje tla prije sjetve (8-10 dana prije presađivanja)	Karda	2,0-4,0 l	Suzbijanje korova prije sadnje
	Clown	2,5 l	Suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova
	Pendus 330 EC	4,0-5,0 l	Suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova
3. Tretiranje presadnica prije sadnje	Ekstrasol	10% (10 l/100 l vode)	Preventivna zaštita protiv gljivičnih i bakterijskih bolesti iz tla *(Phytophthora, Fusarium, Verticillium i dr.)*
4. Tretiranje nakon presađivanja kroz sustav za navodnjavanje kapanjem	Beltanol	4,0 l	Trulež korijena, bakterijsko venuće
	Lana plus	1,0-3,0 kg	Mikorizne gljive i rizosferne bakterije koje potiču bolji razvoj korijena i bolje usvajanje hranjiva
	Grogreen starter	5,0-10,0 kg	NPK gnojivo sa većim udjelom fosfora za bolje ukorjenjivanje
	Bioptimus	2,0 l	Rizobakterije-povećanje dostupnosti hranjiva iz tla
	Cripthum ili	2,0-4,0 l	Huminske i fulvinske kiseline niskog pH
	Hortumus	10,0-12,0 l	Huminske i fulvo kiseline visokog pH
5. Tretiranje nakon presađivanja prskanjem	Golbex WG	1,0 kg	Plamenjača
	Milsaj	0,16 l	Sovice
	FitoMax L-90	1,5 l	Trulež korijena i korijenovog vrata
6. Tretiranje u fazi 5-7 listova	Reboot	0,4 kg	Plamenjača
	Pirecris	1,2 l	Štitasti moljci
	Prev-Gold	0,5%	Pepelnica, koncentrična pjegavost lista
	FitoBio 20	2,0 l	NPK gnojivo sa mikrohranjivima i aminokiselinama
7. Tretiranje u fazi grananja	Manamid	0,8 l	Plamenjača
	Sivar	0,8 l	Pepelnica
	Belthirul	1,0 kg	Sovice
	Microsync B	1,0 l	Gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju
	Fito Film	0,1%	Okvašivač
8. Tretiranje u fazi cvatnje	Armetil 25	0,8 kg	Plamenjača
	Neodif	0,4 l	Pepelnica, koncentrična pjegavost
	Afik	0,2-0,3%	Bijela mušica, uši, tripsi
	Microsync B	1,0 l	Gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju
	Wetcit	0,1%	Okvašivač

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena
9. Tretiranje u vegetaciji	Reboot	0,45 kg	Plamenjača
	Neodif	0,5 l	Pepelnica, koncentrična pjegavost
	Sfenvalo star	0,6 l	Sovice, lisne uši
	Kaishi	1,5 l	Biostimulator
	Wetcit	0,1%	Okvašivač
10. Tretiranje u vegetaciji	Cymofil	0,33 kg	Plamenjača
	Labamba	75 ml	Sovice, lisne uši
	Fungisei	3,0 l	Siva plijesan
	FitoCal gold	2,0 l	Gnojivo na bazi kalcija za bolju kvalitetu i čvrstoću plodova
	Wetcit	0,1%	Okvašivač

Tretiranje ponoviti u razmacima 10-14 dana uz poštivanje karence.
Ukoliko se pojave simptomi plamenjače u tijeku berbe, klasične fungicide zamijeniti proizvodima koji nemaju karencu: **FitoMil L-60 eco** ili **FitoLabicuper** u dozi 2,5-3,0 l/ha.

DODATNE NAPOMENE

- U slučaju pojave stresnih uvjeta (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F MnZn** u dozi 2,0 l ili **Kaishi** 1,5-2,0 l.
- U slučaju pojave crvenog voćnog pauka i grinja, a pri pojavi prvih simptoma ili jedinki, tretirati sredstvom **Kanemite SC** u dozi 0,6-0,9 l/ha ovisno o veličini nasada.
- Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod **pH minus** u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.

