Orijentacijski program zaštite i ishrane SOJE

Suzbijanje korova

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Prije sjetve	Karda	1,5 l	Suzbijanje ranog porasta svih korova	Primijeniti minimalno 48 sati prije sjetve
Nakon sjetve-prije nicanja (pre em)	Pendus 330 EC*	4,0-5,0 l	Suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova	Sredstvo je potrebno primijeniti u roku 2-3 dana nakon sjetve.

Inokulacija sjemena soje

Vrijeme primjene	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Tretman sjemena i do 90 dana prije sjetve	Soya liquid	0,5 l/100 kg sjemena	Inficiranje korijena simbiotskim bakterijama roda *Bradyrhizobium japonicum*	Ne izlagati tretirano sjeme suncu

Prihrana soje

Vrijeme primjene	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Tretiranje biljnih ostataka prethodne kulture odmah poslije žetve	Bio Plug	5,0 l	Aktivacija mikrobiološkog potencijala i razgradnja organske tvari	Može se miješati sa herbicidima
U proljeće prije osnovne obrade	Bio P	2,0 l	Oslobađanje kemijski vezanog fosfora iz tla pomoću bakterijskih fosfataza	*Bacillus megaterrium, Pseudomonas putida*
U osnovnoj obradi ili predsjetveno ili pod redove u sjetvi	Nutri Top Special NPK 4-12-24 S,Ca,Mg 12-7-1	400,0 kg	Opskrba N,P,K,S,Ca,Mg Zn,B,Mn,Fe, huminske i fulvinske kiseline , organski ugljik	Gnojivo ima zaštićen fosfor, sporootpuštajući dušik 40 dana
Primjena gnojiva u sjetvi u direktnom kontaktu sa sjemenom	Microstart NP 10-48 Zn 1%	25,0 kg	Startno mikrogranulirano gnojivo, za snažno i brzo nicanje	Sijačica sa deponatorima mikrogranula
Od faze prve troliske do zatvaranja redova BBCH 13-16	Azoman N-S-Mg (16-8-4)	25,0-30,0 l	Fino izbalansirano folijarno gnojivo, potpuno iskoristivo	Utrošak vode 200 l/ha, razmak između primjena 14 dana
Tretiranje neposredno prije stvaranja uvjeta za razvoj bolesti	FitoField Cu 5,5%	1,5 l	Osigurava potrebni bakar, podiže nivo fitoaleksina i aktivira obrambeni mehanizam biljke	Tretirati kasno poslijepodne ili ujutro kada su puči otvorene. Jača biljku u borbi protiv plamenjače

Vrijeme primjene	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
U stresnim uvjetima (suša, tuča, niske i visoke temperature, jak napad štetnika (grinja, stjenica) i sl.	Amive	1,5 l	Jača staničnu stjenku, aktivira fotosintezu i rad puči	Biostimulator koji sadrži 12% aminokiselina biljnog podrijetla, odmah usvojiv od strane biljke

DODATNE NAPOMENE

- Uz primjenu sredstava za zaštitu bilja preporuka je koristiti pomoćno sredstvo-okvašivač **Fito Film** u koncentraciji 0,2 %. Smanjuje površinsku napetost škropiva, pojačava njegovo prianjanje na lisnu masu, sprječava ispiranje i na taj način povećava djelotvornost sredstava za zaštitu bilja.

