Orijentacijski program zaštite i ishrane
TREŠNJE I VIŠNJE

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
1. Tretiranje u fazi kretanja vegetacije 	Fertipen Cu	2,0 l	Šupljikavost lista, palež cvjetova, bakterioze	Odstraniti sve izboje na kojima ima rak rana iz koje bi na proljeće krenula curiti smola. Primijeniti bakar prije otvaranja pupova s ciljem suzbijanja gljive(Wilsonomyces carpophilus) koja prezimljuje u tim šupljinama i postaje aktivna već pri temperaturi od 7–10 C°.
2. Tretiranje u fazi otvaranja pupa 	Laincoil	15,0 l	Zimska jaja štetnika	Provesti kontrolu prisustva štetnika u nasadima trešnje i višnje.
	Brai	0,5 l	Kalifornijska štitasta uš	
3. Tretiranje u fazi pojave bijelog pupa 	Kastor	2,5 kg	Šupljikavost	Pratiti pojavu lisnih uši.
	Quilatum	0,3%	Lisne uši	
	Microsync B	1,0 l	Gnojivo na bazi bora za povećanje klijavosti polena	
	FitoAlgen F MnZn	1,5 l	Aminokiseline	
	Wetcit	0,15%	Okvašivač	
4. Tretiranje u cvatnji 	Signum	0,75 kg	Monilija	KAISHI-biostimulator na bazi hidroliziranih proteina biljnog porijekla. Kaishi ima veliki udio lizina, aminokiseline koja privlači pčele.
	Kaishi	2,0 l	Biostimulator	
	Ekstrasol	2,5 l	Bakterioze, monilija	
5. Tretiranje u fazi opadanja latica 	Dynamo*	0,7 kg	Šupljikavost lista, kozičavost lista	Pratiti pojavu štetnika i po potrebi ponoviti tretiranje.
	Mospilan 20 SG	0,25 kg	Štetnici	
	FitoAlgen F MnZn	1,5 l	Aminokiseline	
	FitoFol Mn	1,0 l	Gnojivo na bazi mangana za produženje mitoze	
	FitoDimel	0,15%	Okvašivač	
6. Tretiranje u fazi formiranih plodova 	Syllit 544 SC	1,25 l	Kozičavost lista	BIIMORE je biostimulator koji podiže razinu šećera, kvalitetu ploda i dužinu čuvanja.
	Ritmus*	0,5 l	Trešnjina muha	
	Grogreen fruit	3,0 kg	Podizanje šećera u plodu	
	Biimore	0,25 l	Biostimulator	
	Fito Film	0,2 %	Okvašivač	

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Formirani plodovi 	Delmur trap	DELMUR TRAP je lovka sastavljena od insekticida i hranidbenog atraktanta za suzbijanje mediteranske voćne muhe (*Ceratitis capitata*). Lovke se postavljaju u količini 50-80 lovki/ha (najviše jedna lovka/stablu), nakon ulova jedne odrasle jedinke dnevno/lovki za praćenje, 30-40 dana prije promjene boje plodova ili 50 dana prije berbe (BBCH > 70). Broj postavljenih lovki ovisi o brojnosti štetnika. Pri nižoj brojnosti štetnika postaviti manji broj lovki. Lovku je potrebno izvaditi iz ambalaže i postaviti na krajnje grane voćaka, na visinu 140-180 cm. Lovke je potrebno ravnomjerno rasporediti po cijeloj površini voćnjaka.			
7. Tretiranje 7-10 dana prije berbe  	Pirecris*	1,0 l	Lisne uši	FITOCAL GOLD je gnojivo na bazi kalcij-oksida + auksina. Auksin omogućava lakše usvajanje kalcija i u kasnijim fazama dozrijevanja.
	Litoman ultra	5,0 kg	Trešnjina muha	
	FitoCal gold	2,0 l	Gnojivo na bazi kalcija	
	Fito Film	0,2 %	Okvašivač	
	Hortit	4,0 l	Sprječavanje pucanja plodova	Prirodni biostimulator temeljen na specifičnoj kombinaciji osmoregulátora koji štite usjeve od abiotičkog stresa: nagle promjene temperatura, nedostatak ili višak vode, slanost itd.
8. Tretiranje 3 dana prije planirane berbe 	Prev-Gold	0,5 %	Octena mušica ploda (*Drosophila suzukii*)	PREV-GOLD ima vrlo veliku učinkovitost suzbijanja octene mušice ploda. FitoBotryfun je proizvod na prirodnoj bazi za sprječavanje truleži plodova. Nema karencu i ograničenja u primjeni.
	Litoman ultra	5,0 kg		
	FitoBotryfun	2,5 l	Trulež ploda	
9. Tretiranje prije opadanje lista 	Microsync B	1,0 l	Bolja oplodnja i formiranje pupova	Bor utječe na bolju klijavost polena i oplodnju, mangan na veću mitozu, a cink na bolju diferencijaciju pupova u narednoj sezoni.
	FitoFol Zn	1,0 l		
	FitoFol Mn	0,5 l		
	Resil	1,0 l	Biostimulator	
Izdvojeni tretman	Fertipen Cu	1,5 l	Bakterioze	FERTIPEN Cu sadrži bakar i ima utjecaj na suzbijanje bakterioza, a samim time pridonosi boljem općem stanju nasada u narednoj godini.

DODATNE NAPOMENE

- Kod starijih nasada za pročišćavanje provodnih snopova i pomlađivanje rodnih grana tretirati sredstvom **FitoMax L-90** 2 puta u vegetaciji u dozi 2,0 l/ha.
- Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod **pH minus** u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolja topivost a time i bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.
- Ukoliko je prisutna ferokloroza uslijed blokade željeza, prije kiše aplicirati na tlo proizvod **NUTROBI Fe** u dozi od 25-50 g po biljci.
- Sredstva označena sa * nisu registrirana za primjenu u RH u pojedinoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustva u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.

