Orijentacijski program zaštite i ishrane ULJANE REPICE

Suzbijanje korova

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Prije sjetve	Karda	1,5 l	Suzbijanje ranog porasta svih korova	Primijeniti minimalno 48 sati prije sjetve
Nakon nicanja (Post Em)	Trepach	1,2-3,0 l	Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova i samoniklih žitarica	Suzbijanje ukolisnih korova u fazi do 3 lista 1,0-1,2 l/ha

Suzbijanje bolesti

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Jesenski tretman u fazi 4-6 listova, BBCH 14-16; Proljetni tretman od faze pojave cvjetnih pupova do početka razvoja komuški BBCH 50-71	Tebkin 250 EW	1,0 l	Suzbijanje suhe truleži, bijele truleži i koncentrične pjegavosti i koncentracija na razvoj korijena prije zime	Maksimalni broj primjena 2 puta (u jesen i u proljeće)

Suzbijanje štetnika

Faza tretiranja	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
U vrijeme pojave štetnika	Labamba	75 ml	Repičin sjajnik	Kontaktni i želučani insekticid

Prihrana uljane repice

Vrijeme primjene	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Tretiranje biljnih ostataka prethodne kulture odmah poslije žetve	Bio Plug	5,0 l	Aktivacija mikrobiološkog potencijala i razgradnja organske tvari	Može se miješati sa herbicidima
U osnovnoj obradi ili predsjetveno ili pod redove u sjetvi	Nutri Top Special NPK 4-12-24 S,Ca,Mg 12-7 1	400,0 kg	Opskrba N,P,K,S,Ca,Mg Zn,B,Mn,Fe, huminske i fulvinske kiseline, organski ugljik	Gnojivo ima zaštićen fosfor, sporo otpuštajući dušik 40 dana
Prihrana neposredno prije proljetnog porasta	Amosulf NG N-S (33-29)	250,0 kg	Opskrba dušikom i sumporom jednokratnom primjenom	Sporo otpuštajući dušik 90-110 dana
Prije početka intenzivnog porasta BBCH >30	Nitrogenius	1,5 l	Slobodno živući Azotobacter koji fiksira do 80 kg dušika /ha godišnje	Može se miješati sa herbicidima i fungicidima
U vrijeme intenzivnog porasta	Azoman (N-S-Mg) 16-8-4	25,0-30,0 l	Fino izbalansirano folijarno gnojivo, potpuno iskoristivo	Utrošak vode 200 l/ha, razmak između primjena 14 dana

Vrijeme primjene	Proizvod	Doza/ha	Namjena	Napomena
Tretiranje neposredno prije cvatnje	FitoFol Bor	4,0 l	Pospješuje razvoj rozete i povećava klijavost polena	
U stresnim uvjetima (suša, tuča, niske temperature i sl.)	Amive	1,5 l	Regulira stanični metabolizam, jača staničnu stjenku, aktivira fotosintezu i rad puči	Biostimulator koji sadrži 12% aminokiselina biljnog podrijetla, odmah usvojiv od strane biljke

DODATNE NAPOMENE

- Uz primjenu sredstava za zaštitu bilja preporuka je koristiti pomoćno sredstvo-okvašivač **Fito Film** u dozi 0,2 % na vodu koja se koristi u zaštiti. Smanjuje površinsku napetost škropiva, pojačava njegovo prianjanje na lisnu masu, sprječava ispiranje i na taj način povećava djelotvornost sredstava za zaštitu bilja.

